

医学教育网妇产科主治医师:《答疑周刊》2024年第38期

今天一起来做几道羊水量异常的题目,看看大家对这块内容的掌握情况怎么样!

问题索引:

1. 属于羊水过多处理的项目,正确的是?
2. 羊水过少是指羊水量少于?
3. 羊水过少的处理错误的是?

具体解答:

1. 属于羊水过多处理的项目,正确的是?

属于羊水过多处理的项目,正确的是

- A. 一经发现应立即终止妊娠
- B. 高位破膜后无需行缩宫素引产
- C. 羊膜腔穿刺放羊水一次量为 2000ml
- D. 较长时间服用吲哚美辛治疗
- E. 确诊胎儿畸形,应及时终止妊娠

【正确答案】E

【答案解析】羊水过多的处理主要取决于胎儿有无畸形和孕妇症状的严重程度。

1. 羊水过多合并胎儿畸形处理原则为及时终止妊娠。可行高位破膜引产或依沙吖啶引产。
2. 羊水过多合并正常胎儿应根据羊水过多的程度与胎龄决定处理方法 [医学教育网原创]。

2. 羊水过少是指羊水量少于?

羊水过少是指羊水量少于

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 600ml
- E. 700ml

【正确答案】 A

【答案解析】 妊娠晚期羊水量少于 300ml 称羊水过少 [医学教育网原创] 。

3. 羊水过少的处理错误的是？

羊水过少的处理错误的是

- A. 孕中晚期羊水过少可行羊膜腔灌注法
- B. 若妊娠足月，应尽早破膜
- C. 剖宫产可降低围生儿病死率
- D. 羊水过少确诊后，一律剖宫产
- E. 多次羊膜腔输液可致绒毛膜羊膜炎

【正确答案】 D

【答案解析】 羊水过少合并正常胎儿终止妊娠：对于合并胎盘功能不良、胎儿窘迫，或破膜时羊水少且胎粪严重污染者，估计短时间不能结束分娩的，应采用剖宫产术终止妊娠。对于胎儿储备功能尚好，无明显宫内缺氧，可以阴道试产 [医学教育网原创]。