

【牙体牙髓病学】

正常情况下,最易引起牙本质敏感症的釉牙骨质界结构为

- A. 少量牙骨质覆盖在牙釉质表面
- B. 多量牙骨质覆盖在牙釉质表面
- C. 牙釉质与牙骨质端端相接
- D. 牙釉质与牙骨质分离
- E. 以上都不是

【正确答案】D

【答案解析】

釉牙骨质界釉质和牙骨质在牙颈部相连,其相连处有三种不同情况:约有60%是牙骨质少许覆盖在釉质上;约30%是釉质和牙骨质端端相连;还有10%是两者不相连,该处牙本质暴露,而为牙龈所覆盖。在后一种情况下,一旦牙龈萎缩,暴露牙本质即容易发生牙本质过敏。

【牙体牙髓病学】

临床上检查牙本质过敏部位常用的方法为

- A. 热诊
- B. 冷诊
- C. 探诊
- D. 叩诊
- E. 酸甜试验

【正确答案】C

【答案解析】

探诊是牙本质过敏最可靠的诊断方法,可用尖锐的探针在牙面上滑动,可找到1个或数个过敏区。

【口腔黏膜病学】

白斑的发病特点如下,除外

- A. 与吸烟有关
- B. 女性多于男性
- C. 与刺激食物有关
- D. 发病以中老年较多
- E. 与某些全身因素有关

【正确答案】B

【答案解析】

口腔白斑与吸烟、饮酒、嚼槟榔、念珠菌感染和环境中的有毒物质及致癌剂有关。口腔中的机械刺激、温度刺激、电流刺激或不良修复体也可引起白斑。男、女性发病比率没有明确表述。

【口腔黏膜病学】

关于疣状白斑下列哪项说法是错误的

- A. 表面有毛刺状突起
- B. 表面高低不平
- C. 与烟酒刺激无关
- D. 有明显的局部刺激因素
- E. 基底无明显硬结

【正确答案】C

【答案解析】

口腔白斑的病损的发病因素与吸烟、饮酒、嚼槟榔等行为有关。疣状型: 损害隆起, 表面高低不平, 伴有乳头状或毛刺状突起, 触诊微硬。除位于牙龈或上腭外, 基底无明显硬结, 损害区粗糙感明显。