

中医执业医师-模拟试卷（第四单元）


一、A1 型题


1. 白疔（寻常型）血热内蕴证采用的治疗方药为

A. 清瘟败毒饮 

B. 萆薢渗湿汤

C. 桃红四物汤

D. 犀角地黄汤 


E. 当归饮子 


2. 黄水疮主要治法为

A. 健脾除湿 

B. 凉血息风

C. 益气补血

D. 清暑利湿 

E. 滋补肝肾 

3. 脂溢性皮炎风热血燥证最佳方药为

A. 五味消毒饮

B. 消风散合当归饮子 


C. 七宝美髯丹 

D. 参苓白术散

E. 八珍汤


4. 脂溢性皮炎肠胃湿热证最佳方药为


A. 五味消毒饮 

B. 通窍活血汤 

C. 四物汤合六味地黄汤

D. 消风散合当归饮子

E. 参苓白术散合茵陈蒿汤 

5. 下列有关毛细血管瘤的特点，叙述正确的是 

A. 边界不清

B. 瘤体巨大

C. 质地坚硬

D. 皮色鲜红

E. 压之不褪色

6. 下列膏药，性偏寒凉，能消肿、解毒、提脓、祛腐、止痛的是

A. 黄连膏

B. 金黄膏

C. 玉露膏

D. 冲和膏

E. 千捶膏

7. 治疗瘾疹血虚风燥证，应首选的方剂是

A. 麻黄桂枝各半汤

B. 消风散

C. 防风通圣散

D. 当归饮子

E. 二仙汤

8. 五指并拢时，一只手掌的面积占全身体表面积的比例是

A. 0.5%

B. 1%

C. 2%

D. 5%

E. 9%

9. 下列各项，不属破伤风前驱期症状的是

A. 头痛、头晕

B. 阵发性抽搐

C. 烦躁、打呵欠

D. 咀嚼无力

E. 张口略感不便

10. 属于瘾疹的特点是

A. 呈带状分布的红斑上成簇的水疱

B. 大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退

C. 皮肤上浅在性脓疱和脓痂

D. 皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑

E. 对称分布，多形损害，剧烈瘙痒

11. 有头疽的病因病机，说法错误的是

A. 感受风温，湿热之毒

B. 情志内伤，气郁化火

C. 劳伤精气，相火炽盛

D. 膏粱厚味，湿热火毒

E. 先天不足，后天失养

12. 烧伤面积的计算按中国九分法，成人头、面、颈部为

A. 6%

B. 9%

C. 18%

D. 21%

E. 27%

13. 湿热下注型前列腺增生的中医主治方剂为

A. 八正散

B. 知柏地黄汤

C. 金锁固精丸

D. 沉香散

E. 以上均非

14. 托盘疔多发生于

A. 指端

B. 手掌

C. 指甲背

D. 指甲旁

E. 掌指关节

15. 不适合用清热法治疗的是

A. 流痰后期，阴虚火旺，虚热不退者

B. 药物性皮炎皮损色红灼热

C. 局部红、肿、热、痛

D. 热毒内传之走黄内陷

E. 疮色晦暗不泽，皮温较低

16. 下列哪项不属于确认成脓的方法

A. 穿刺法

B. 透光法

C. 挂线法

D. 接触法

E. B 超

17. 肛裂的主要特点是

A. 疼痛，坠胀，便秘

B. 疼痛，出血，瘙痒

C. 瘙痒，疼痛，便秘

D. 疼痛，出血，便秘

E. 出血，坠胀，脱垂

18. 乳癖冲任失调证的治疗方剂是

A. 归脾汤

B. 逍遥蒺贝散

C. 补中益气汤

D. 二仙汤合开郁散

E. 二仙汤合四物汤

19. 饮食不节所致外科疾病的特点是

A. 经络阻塞，气血凝滞

B. 阴液受损，咽喉干燥

C. 脏腑气血受损，阴阳失和

D. 具有一定传染性

E. 脾胃功能失调，湿热火毒内生

20. 关于蛇串疮的特点, 说法正确的是

- A. 痒痒性风团, 发无定处, 骤起骤退
- B. 带状分布, 皮肤上成簇的水疱
- C. 皮肤上浅在性脓疱和脓痂
- D. 皮肤黏膜交界处成群的水疱
- E. 对称分布, 多形损害, 剧烈瘙痒

21. 创面边缘整齐, 多呈半月形, 坚硬削直而如凿成, 基底部高低不平, 有稀薄臭秽分泌物。其溃疡属于

- A. 梅毒性溃疡
- B. 岩性溃疡
- C. 麻风性溃疡
- D. 压迫性溃疡
- E. 疮痍性溃疡

22. 疮面呈翻花或如岩穴的溃疡属

- A. 岩性溃疡
- B. 流痰溃疡
- C. 瘰疬溃疡
- D. 麻风溃疡
- E. 梅毒溃疡

23. 疮疡三陷证中, 火陷证的治法是

- A. 托毒透邪, 养阴清心开窍
- B. 生津养胃, 清心解毒
- C. 凉血清热解毒, 兼顾护津液
- D. 补益气血, 清心安神开窍
- E. 温补脾肾, 清心开窍

24. 下列各项中, 需用砭镰法治疗的是

- A. 蛇眼疔
- B. 蛙节疔
- C. 托盘疔

D. 红丝疔

E. 颜面部疔

25. 对于子痰溃后症状的叙述，错误的是

A. 溃后易敛 

B. 容易形成窦道

C. 脓液清稀

D. 易反复发作

E. 脓液中夹有豆腐渣样絮状物

26. 治疗阴疮寒湿证，应首选的方剂是

A. 仙方活命饮 

B. 龙胆泻肝汤

C. 蛇床子散


D. 萆薢渗湿汤

E. 托里消毒散

27. 下列各项，属经断复来湿毒瘀结证临床表现的是

A. 腰膝酸软，潮热盗汗

B. 纳谷不馨，大便不爽 

C. 口苦口干，小便短赤 

D. 神疲肢倦，食少腹胀

E. 夹有杂色带下，恶臭

28. 治疗绝经前后诸证肾阴阳俱虚证，应首选的方剂是

A. 左归丸合二至丸 

B. 二仙汤合二至丸

C. 右归丸合二至丸

D. 金匱肾气丸

E. 六味地黄丸

29. 闭经痰湿阻滞证的治法是 

A. 健脾燥湿化痰，活血调经

B. 燥湿祛痰，行气通经

C. 健脾祛湿，活血调经

D. 燥湿祛痰，健脾止带

E. 燥湿健脾，消食导滞

30. 下列各项，不属于妊娠生理现象的是

A. 月经停闭

B. 乳头变黑

C. 腹胀便秘

D. 脉滑

E. 晨起恶心欲呕

31. 治疗慢性盆腔炎气滞血瘀证，应首选的方剂是

A. 桃红四物汤

B. 理冲汤

C. 膈下逐瘀汤

D. 少腹逐瘀汤

E. 大黄牡丹汤

32. 治疗子晕脾虚肝旺证，应首选的方剂是

A. 八珍汤

B. 逍遥散

C. 杞菊地黄丸

D. 柴胡舒肝散

E. 半夏白术天麻汤

33. 患者产后恶露不绝的主要病因是

A. 气虚、血虚、寒湿

B. 气虚、肝郁、血热

C. 气虚、血热、血瘀

D. 气虚、血虚、血瘀

E. 气虚、血虚、血热

34. 不属于妊娠恶阻肝胃不和证临床表现的是

A. 头胀而晕

B. 胸满胁痛

C. 暖气叹息

D. 口干口苦

E. 呕吐清涎或痰涎



35. 对于产后腹痛气血两虚证，治疗应首选

A. 血府逐瘀汤

B. 当归芍药散

C. 小建中汤

D. 八珍汤

E. 肠宁汤



36. 治疗崩漏实热证，应首选

A. 固本止崩汤

B. 清热固经汤

C. 清热调血汤

D. 左归丸

E. 保阴煎



37. 阴挺之肾虚证的主治方剂是

A. 四君子汤

B. 六君子汤

C. 补中益气汤

D. 肾气丸

E. 大补元煎

38. 治疗经间期出血湿热证，应首选的方剂是

A. 举元煎

B. 补中益气汤

C. 加减一阴煎

D. 清肝止淋汤

E. 逐瘀止血汤



39. 下列各项，不属于子宫脱垂中医病名的是

A. 产肠不收

B. 阴脱

C. 阴挺

D. 阴蚀

E. 阴痔

40. 治疗阴疮热毒证，应首选的方剂是

A. 神功内托散

B. 萆薢渗湿汤

C. 阳和汤

D. 龙胆泻肝汤

E. 托里消毒散

41. 治疗带下过少血枯瘀阻证，应首选

A. 小营煎

B. 六味地黄丸

C. 左归丸

D. 右归丸

E. 四物汤

42. 胎漏、胎动不安血热证治法为

A. 活血化瘀，补肾安胎

B. 补气养血，固肾安胎

C. 补肾健脾，益气安胎

D. 清热凉血，养血安胎

E. 以上均不正确

43. 下列哪项不属于妊娠病的范畴

A. 胞阻

B. 子冒

C. 宫缩痛

D. 胞转

E. 恶阻病

44. 急惊风的四证是指

A. 热、惊、痰、火

B. 热、痰、惊、风

C. 热、痰、火、积

D. 热、风、火、寒

E. 热、痰、积、惊

45. 小儿遗尿的病机主要是

A. 肝经郁热, 疏泄失司

B. 脾肾气虚, 下元不固

C. 肾气不足, 膀胱虚寒

D. 肺脾气虚, 水道失约

E. 心肾失交, 水火不济

46. 反复呼吸道感染恢复期治法中, 错误的是

A. 补气固表

B. 温卫和营

C. 温补脾肾

D. 疏风解表

E. 滋养肺脾

47. 口疳的病位主要涉及

A. 脾、肾

B. 心、肝

C. 心、脾

D. 肝、脾

E. 肝、胆

48. 治疗小儿贫血肝肾阴虚证, 应首选方剂是

A. 右归丸

B. 四物汤

C. 归脾汤

D. 六君子汤

E. 左归丸

49. 小儿尿频湿热下注证的治法是

A. 滋阴补肾，清热降火

B. 利湿通淋，清肝泻火

C. 清热利湿，通利膀胱

D. 清热泻火，固涩小便

E. 健脾利湿，升提固摄

50. 抽动障碍气郁化火证的治法是

A. 疏肝清热，活血化瘀

B. 清热解毒，行气解郁

C. 疏肝解郁，息风镇惊

D. 清肝泻火，息风镇惊

E. 泻火解郁，活血通络

51. 硬肿症的内因是

A. 肾阳虚衰

B. 脾肾阳虚

C. 肺脾气虚

D. 肝肾阴虚

E. 脾肾两虚

52. 口疮患儿发病年龄多见于

A. 6~8 岁

B. 0~1 岁

C. 1~2 岁

D. 2~4 岁

E. 4~6 岁

53. 治疗口疳应首选的方剂是

A. 防己黄芪汤

B. 参苓白术散

C. 肥儿丸

D. 石斛夜光丸

E. 泻心导赤散

54. 夏季热的主要临床特征是

A. 发热，口渴多饮，多尿，多汗

B. 长期发热，口渴多饮，多尿，汗闭

C. 发热，口渴，便秘，尿少

D. 大热，大渴，大汗，脉洪大

E. 发热，多食多饮，多尿，消瘦

55. 夜啼的主要病变脏腑是

A. 心、肝

B. 心、肾

C. 肝、脾

D. 心、脾

E. 肝、肾

56. 4 岁小儿的正常身高约为

A. 55cm

B. 62cm

C. 73cm

D. 98cm

E. 120cm

57. 风痧之邪入气营证，治疗应首选的方剂是

A. 清气凉营汤

B. 白虎加人参汤

C. 透疹凉解汤

D. 银翘散

E. 解肌透痧汤

58. 麻疹收没期症状特点是

A. 有色素沉着，并有糠麸状脱屑

B. 有色素斑痕，可见脱皮

C. 无色素斑痕及脱屑

D. 有色素斑痕，无脱屑

E. 无色素斑痕，可见脱皮

59. 下列有关流行性出血热的叙述，正确的是

A. 患者为主要传染源

B. 感染后多隐性发病

C. 家鼠型隐性感染率较低

D. 病后可获持久免疫

E. 儿童发病率高

60. 肺炎型流感在临床中最常见的人群是

A. 2 岁以下小儿

B. 孕妇

C. 中老年

D. 青少年

E. 学龄前儿童

61. 下列有关乙脑止痉的处理，不正确的是

A. 高热所致者以降温为主

B. 脑水肿所致者以脱水降低颅内压为主

C. 因脑实质病变引起的抽搐，可使用镇静剂

D. 脑水肿以 20%甘露醇快速静脉滴注

E. 脑实质病变引起的抽搐，首选山梗菜碱

62. 引起伤寒不断传播或流行的主要传染源是

A. 普通型患者

B. 慢性带菌者

C. 顿挫型患者

D. 恢复期患者

E. 潜伏期患者

63. 下列哪项不是急性细菌性痢疾的典型临床表现

A. 发热

B. 呕吐

C. 腹痛

D. 黏液便

E. 里急后重

64. HBsAg 阳性的母亲，为预防所生新生儿感染 HBV，最有效的措施是注射

A. 乙肝疫苗加丙种球蛋白

B. 乙肝免疫球蛋白加乙肝疫苗

C. 丙种球蛋白

D. 乙肝免疫球蛋白

E. 乙肝疫苗

65. 下述各项，属低效消毒剂的是

A. 碘类  医学教育网
www.med66.com



B. 苯扎溴铵

C. 酚类消毒剂

D. 电离辐射



E. 戊二醛

66. 下列有关戊型肝炎的流行特征，叙述不正确的是


A. 存在流行和散发两种形式  医学教育网
www.med66.com



B. 流行主要发生于不发达国家

C. 多发生于雨季或洪水泛滥之后


D. 散发病例主要是冬春季节

E. 老年人戊型肝炎所占比例更高  医学教育网
www.med66.com



67. 细菌性痢疾的主要病变部位是

A. 回肠末端

B. 乙状结肠与直肠  医学教育网
www.med66.com

C. 升结肠  医学教育网
www.med66.com



D. 降结肠

E. 小肠


68. 与流脑患者密切接触后，重要预防措施是

A. 口服氯霉素  医学教育网
www.med66.com

B. 菌苗预防注射

C. 口服磺胺药

D. 隔离治疗

E. 注射青霉素  医学教育网
www.med66.com



69. 有关脑膜炎球菌的描述，下列不正确的是

A. 目前我国流行株以 C 群为主

B. 与淋球菌样也属奈瑟菌属

- C. 呈肾形
- D. 仅存于人体
- E. 内毒素是致病重要因素
70. 流行性出血热的发病机制主要是
- A. 病毒本身不致病
- B. 病毒直接作用
- C. 免疫损伤作用
- D. 病毒直接作用及免疫损伤作用
- E. 病毒产生毒素引发机体损伤
71. 下列有关流行性出血热多尿期的叙述，错误的是
- A. 一般出现在病程的 9~14 日
- B. 肾小球滤过功能恢复
- C. 持续时间一般为 7~14 日
- D. 肾小管重吸收功能已经完全恢复
- E. 可发生休克
72. 传染病的预防分为
- A. 管理传染源，切断传播途径，保护易感人群
- B. 管理食物、水源、粪便、消灭蚊蝇
- C. 切断社会因素和自然因素
- D. 环境卫生管理，水源食物管理、灭蝇
- E. 管理水，管理饮食，卫生管理，灭蝇
73. 某种传染病在某一地区的发病率高于一般水平，称为
- A. 大流行
- B. 流行
- C. 散发
- D. 暴发
- E. 以上都不对
74. 乙脑预防的关键措施是
- A. 注射丙种球蛋白

- B. 管理患者
- C. 管理猪等家畜

- D. 防蚊和灭蚊
- E. 防蚊、灭蚊及预防注射



75. 下列哪项是流感病毒容易发生变异的原因

- A. 核酸分节段
- B. 核心中含 RNA 多聚酶
- C. 外层为脂质双层膜
- D. 有两层包膜
- E. 包膜内层为基质蛋白



76. 下列哪项属于重型病毒性肝炎出血倾向的最主要原因

- A. 凝血因子消耗增加
- B. 毛细血管脆性增加
- C. 维生素 K 吸收障碍
- D. 凝血因子合成障碍
- E. 血小板减少



77. 某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平，称为

- A. 暴发
- B. 大流行
- C. 散发
- D. 流行
- E. 以上都不正确



78. 伤寒患者解除隔离的标志是

- A. 体温下降至正常
- B. 血嗜酸粒细胞恢复正常
- C. 临床症状消失后粪便培养连续 2 次阴性
- D. 临床症状消失后 2 周
- E. 自发病之日起已隔离满 2 周

二、A2 型题

79. 患者外生殖器出现疣状赘生物，色灰，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。其证候是

A. 血脉瘀阻证

B. 湿热壅盛证

C. 营血两伤证

D. 邪毒内陷证

E. 湿毒下注证

80. 患者王某，便时肛内常有肿物脱出，色紫黯，甚则表面溃破、糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗宜选用

A. 萆薢渗湿汤

B. 补中益气汤

C. 马勃散

D. 升麻葛根汤

E. 以上均非

81. 患者，右足怕冷，麻木、疼痛，间歇性跛行年余。近两个月来足痛加剧，夜难入寐，步履艰难，足背动脉搏动消失。应诊断为

A. 痹证

B. 脱疽

C. 糖尿病足

D. 下肢静脉炎

E. 雷诺综合征

82. 患儿，男，8岁。头皮部初起丘疹色红，灰白色鳞屑成斑，毛发干枯，容易折断，易于拔落而不疼痛，已有1年余，自觉瘙痒。其诊断是

A. 白疕

B. 圆癣

C. 肥疮

D. 银屑病

E. 白秃疮

83. 患者，男，65岁。颈部肿块溃破年余，长期渗流脓血，不能愈合，疮面苍白水肿，肉芽

高低不平，脘肉翻花。伴低热，乏力，消瘦等。舌质淡，苔白或无苔，脉沉细。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 香贝养荣汤
- C. 和营散坚丸
- D. 开郁散
- E. 八珍汤合四妙勇安汤

84. 患者，女性，28 岁，产后乳房胀痛，位于乳房外上方皮肤嫩红，肿块形似鸡卵，压痛明显，按之中软，有波动感，伴壮热口渴。切开引流的位置及切口是

- A. 以乳头为中心的弧形切口
- B. 脓肿波动明显处做切口
- C. 循乳络方向做放射状切口
- D. 乳晕旁弧形切口
- E. 脓肿处做任意切口

85. 患者带下量多，色黄，如豆渣状，阴部瘙痒；脘闷纳差，舌红，苔黄腻，脉滑数。其治法是

- A. 健脾益气，升阳除湿
- B. 温肾培元，固涩止带
- C. 滋肾益阴，清热利湿
- D. 清热利湿，疏风化痰
- E. 清利湿热，佐以解毒杀虫

86. 患者，女性，23 岁，未婚。经期延后，量少、色黯、有血块，腹痛拒按喜热，畏寒，舌暗苔白，脉沉紧。其治法是

- A. 扶阳祛寒调经
- B. 温经散寒调经
- C. 暖宫止痛调经
- D. 理气止痛调经
- E. 活血行气调经

87. 患者，女性，30 岁，已婚。经来无期，量少淋漓不尽或量多势急，血色鲜红；面颊潮红，烦热少寐，咽干口渴，便结，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选

- A. 逐瘀止血汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 上下相资汤

88. 患者阴部搔痒难忍，会阴部肤色变浅白，皮肤粗糙，皴裂破溃；眩晕耳鸣，五心烦热，烘热汗出，腰酸腿软，口干不欲饮，舌红苔少，脉细数无力。治疗应首选的方剂是

- A. 知柏地黄汤
- B. 左归丸
- C. 六味地黄汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 易黄汤

89. 患者张某，经期烦躁易怒，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红，舌红，苔黄，脉弦数。其治法是

- A. 清肝泄热，解郁安神
- B. 清热化痰，宁心安神
- C. 补血养心，安神定志
- D. 祛痰通络，安神定志
- E. 以上均非

90. 已婚女性，26 岁。月经延后 2 周，量少、色淡、质稀，心悸少寐，小腹绵绵作痛，面色苍白，舌淡苔薄白，脉细弱。治疗应首选

- A. 大补元煎
- B. 十全大补汤
- C. 人参养营汤
- D. 补中益气汤
- E. 四君子汤

91. 陈某，女，婚后 5 年未怀孕，月经多推后几天，经来小腹胀痛，经色紫黯，有血块，块下痛减，有时经行不畅；伴见肛门坠痛，性交痛；舌质紫黯，脉弦细涩。治疗选用

- A. 少腹逐瘀汤

B. 苍附导痰丸

C. 百灵调肝汤

D. 养精种玉汤

E. 以上均非

92. 患者下腹部肿块，疼痛月余，伴低热，经行量多，带下量多，色黄如脓；身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤。妇检盆腔右侧触及鸭卵大包块，形不整，触压痛阳性；舌红苔黄，有瘀斑，脉弦滑数。其治法是

A. 清热利湿，缓急止痛

B. 清热解毒，利湿止带

C. 清热利湿，化瘀消癥

D. 清热利湿，消癥止血

E. 清热利湿，止血调经

93. 患者经血过期不净，量多，色淡，质稀，倦怠乏力，气短懒言，小腹空坠。面色（白光）白；舌淡，苔薄，脉缓弱。其治法是

A. 补气摄血，固冲调经

B. 健脾养血，调经止血

C. 补益脾肾，摄血固冲

D. 健脾益气，调经止血

E. 健脾固冲，养血止血

94. 患儿，3岁。面色苍白，神疲乏力，发黄稀疏，消瘦3个月，诊断为营养性缺铁性贫血。选用铁剂治疗时，正确的停药时间为

A. 血红蛋白恢复至正常后4个月左右

B. 血红蛋白恢复至正常后6个月左右

C. 血红蛋白开始升高时

D. 血红蛋白恢复正常时

E. 血红蛋白恢复至正常后2个月左右

95. 患儿，生后2天。全身欠温，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，臀、小腿、臂、面颊硬肿，色暗红、青紫，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，气息微弱，指纹紫滞。辨证为

A. 气滞血瘀证

B. 阳气虚衰证

C. 脾肾虚衰证

D. 肺脾气虚证

E. 寒凝血涩证

96. 患儿，8 个月。晨起啼哭不安，阵阵捧腹啼叫，已解清稀大便 3 次，便多泡沫，臭气轻，可闻肠鸣，恶寒发热，鼻流清涕，指纹淡红。其证候是

A. 脾虚泻

B. 脾肾阳虚泻

C. 湿热泻

D. 风寒泻

E. 伤食泻

97. 患儿，7 岁，男。症见多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，注意力不集中，难以静坐，舌质红，舌苔薄，脉细弦。治疗应首选方剂是

A. 清心涤痰汤

B. 黄连温胆汤

C. 龙胆泻肝汤

D. 泻心导赤散

E. 杞菊地黄丸

98. 患儿，2 岁。患有痫证，起病前常有惊吓史。每次发作时惊叫，吐舌，急啼，面色时红时白，惊惕不安，四肢抽搐，大便黏稠，舌淡红，舌苔白，指纹色青。治疗应首选的方剂是

A. 镇惊丸

B. 涤痰汤

C. 定痫丸

D. 远志丸

E. 定魄丸

99. 患儿，4 岁。突然出现神昏惊厥，伴发热头痛，咳嗽流涕，咽红，舌苔薄黄，脉象浮数。治疗应首选的方剂是

A. 桑菊饮

B. 紫雪丹

C. 柴葛解肌汤

D. 银翘散

E. 银翘散合羚角钩藤汤

100. 患儿，5岁，诊断为猩红热，现壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。治疗首选的方剂是

A. 益胃汤

B. 沙参麦冬汤

C. 竹叶石膏汤

D. 增液承气汤

E. 凉营清气汤

101. 患儿，3岁。平素饮食肥甘厚味，现症见汗出，以自汗为主，以额、心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。诊断为汗证，其治法为

A. 益气养阴

B. 调和营卫

C. 益气固表

D. 清热泻脾

E. 清热固表

102. 患儿，7岁。平素身体虚弱，紫癜反复出现，瘀斑、瘀点颜色淡紫，常有鼻衄、齿衄，面色苍黄，神疲乏力，食欲不振，头晕心慌，舌淡苔薄，脉细无力。治疗应首选的方剂是

A. 黄连解毒汤

B. 犀角地黄汤

C. 麻黄连翘赤小豆汤

D. 归脾汤

E. 连翘败毒散

103. 患儿，生后4天。症见全身欠温，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，臀、小腿、臂、面颊硬肿，色暗红、青紫，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，气息微弱，指纹紫滞。应首选的方剂是

- A. 参附汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 附子理中汤
- D. 当归四逆汤
- E. 人参五味汤

三、A3/A4 型题

(104~106 题共用题干)

患者，女，27 岁，产后 1 月余，突然出现左乳肿块红肿疼痛，乳汁排出不畅，伴发热，体温最高达 39.5℃，查左乳外侧红肿，范围约 6cm×6cm×4cm 大小，表面皮薄光亮，中心区变软，按之应指，局部皮温高，压痛明显，舌质红，苔黄腻，脉洪数。查血常规 WBC $14\times 10^9/L$ 。

104. 辨证为

- A. 气滞热壅证
- B. 肝郁痰凝证
- C. 正虚毒恋证
- D. 热毒炽盛证
- E. 火毒炽盛证

105. 治法为

- A. 疏肝清胃，通乳消肿
- B. 调补气血，清热解毒
- C. 清热解毒，通乳消肿
- D. 清热解毒，托里透脓
- E. 益气 and 营托毒

106. 治疗应选代表方剂为

- A. 瓜蒌牛蒡汤
- B. 托里消毒散
- C. 柴胡疏肝散
- D. 逍遥散
- E. 透脓散

(107~109 题共用题干)

患者，女，25 岁。经前乳房乳头胀痛，甚至不能触衣，胸胁作胀，烦躁易怒，舌苔正常，脉弦。

107. 治疗时采用的治法为

- A. 理气行滞调经
- B. 疏肝理气，和胃通络
- C. 理气活血，祛瘀通经
- D. 理气行滞，化瘀止痛
- E. 疏肝理气调经

108. 治疗时最佳选方为

- A. 加味乌药散
- B. 清肝引经汤
- C. 逍遥散
- D. 四逆散
- E. 柴胡疏肝散

109. 治疗时可适当加减

- A. 麦芽、青皮、鸡内金
- B. 麦芽、小茴香、鸡内金
- C. 石菖蒲、青皮、鸡内金
- D. 元胡、蒲黄、五灵脂
- E. 当归、川芎、白芍

(110~112 题共用题干)

患儿，5 岁。咳嗽 1 周。证见咳嗽痰多，痰黄黏稠，难咯，喉间时有痰鸣，发热口渴，尿少色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

110. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风寒咳嗽证
- B. 风热咳嗽证
- C. 风燥咳嗽证
- D. 痰湿咳嗽证

E. 痰热咳嗽证

111. 治疗宜采用的治法为

A. 疏风解热，宣肺止咳

B. 疏风散寒，宣肺止咳

C. 疏风清肺，润燥止咳

D. 清热化痰，宣肺止咳

E. 燥湿化痰，宣肺止咳

112. 治疗采用的代表方为

A. 清金化痰汤

B. 桑菊饮

C. 沙参麦冬汤

D. 麻杏石甘汤

E. 黄连解毒汤合三拗汤

四、B 型题

(113~114 题共用选项)

A. 清热凉血，解毒消斑

B. 清利湿热，解毒通络

C. 养血滋阴，润肤息风

D. 清热泻火，凉血解毒

E. 活血化瘀，解毒通络

113. 治疗白疮湿毒蕴阻证，采用的治疗方法为

114. 治疗白疮火毒炽盛证，采用的治疗方法为

(115~116 题共用选项)

A. 防风通圣散

B. 龙胆泻肝汤

C. 当归饮子

D. 消风散

E. 麻黄桂枝各半汤

115. 治疗瘾疹风寒束表证，采用的治疗方药为

116. 治疗瘾疹风热犯表证，采用的治疗方药为

(117~118 题共用选项)

A. 小儿化湿汤

B. 消风散

C. 消风导赤汤

D. 龙胆泻肝汤合化斑解毒汤

E. 当归饮子合消风散

117. 接触性皮炎风热蕴肤证最佳选方为

118. 接触性皮炎湿热毒蕴证最佳选方为

(119~120 题共用选项)

A. 血热证

B. 血虚证

C. 气虚证

D. 血瘀证

E. 气滞证

119. 恶露量多，色紫红，有块，腹痛拒按，其辨证是

120. 恶露量多，色红有臭气，其辨证是

(121~122 题共用选项)

A. 月经后期

B. 子宫脱垂

C. 月经先期

D. 月经过少

E. 滑胎

121. 肾气虚，封藏失职，冲任不固，可导致的疾病是

122. 肾气虚，胎失所系，冲任不固，可导致的疾病是

(123~124 题共用选项)

A. 归肾丸

B. 桃红四物汤

C. 乌药汤

D. 苍附导痰丸

E. 滋血汤

123. 治疗月经过少血瘀证，应首选

124. 治疗月经过少痰湿证，应首选

(125~126 题共用选项)

A. 清肝止淋汤

B. 归脾汤

C. 加减一阴煎

D. 当归补血汤

E. 清热固经汤

125. 治疗经间期出血之脾气虚证，应首选

126. 治疗经间期出之湿热证，应首选

(127~128 题共用选项)

A. 疏肝理气，散瘀除热

B. 滋养肝肾，育阴清热

C. 补益血气，甘温除热

D. 补益肾气，清热调经

E. 活血化瘀，清热凉血

127. 经行发热肝肾阴虚证的治法是

128. 经行发热血气虚弱证的治法是

(129~130 题共用选项)

A. 乌梅丸

B. 鹤虱丸

C. 驱蛔承气汤

D. 使君子散

E. 驱虫粉

129. 治疗蛔虫病肠虫证首选

130. 治疗蛔虫病蛔厥证首选

(131~132 题共用选项)

- A. 清心泻火，滋阴生津
- B. 温阳健脾，利水消肿
- C. 健脾健运
- D. 消积理脾
- E. 补益气血

131. 疝积证的主要治法是

132. 口疳证的主要治法是

(133~134 题共用选项)

- A. 调和肝脾，佐以益气
- B. 疏肝健脾，佐以助运
- C. 调和脾胃，运脾开胃
- D. 健脾益气，佐以助运
- E. 滋脾养胃，佐以助运

133. 厌食脾胃气虚证，其治法是

134. 厌食脾胃阴虚证，其治法是

(135~136 题共用选项)

- A. 小儿浮肿兼见尿少或尿闭，恶心呕吐，苔腻，脉弦
- B. 小儿浮肿兼见咳嗽气急，心悸胸闷，口唇青紫，脉细
- C. 小儿浮肿水肿大都先从眼睑开始，继而四肢，甚则全身浮肿，来势迅速
- D. 小儿浮肿兼见脓疮、疖肿、丹毒等，舌质红，苔黄腻
- E. 小儿浮肿兼见头痛眩晕，视物模糊，苔黄，脉弦

135. 水肿风水相搏证的证候特征是

136. 水肿湿热内侵证的证候特征是

(137~138 题共用选项)

- A. 透疹凉解汤
- B. 银翘散合养阴清肺汤
- C. 桑菊饮
- D. 麻杏石甘汤
- E. 银翘散

137. 奶麻邪郁肌表首选的方剂是

138. 奶麻毒透肌肤首选的方剂是

(139~140 题共用选项)

A. 天定风珠 

B. 固真汤

C. 远志丸

D. 抱龙丸 

E. 缓肝理脾汤 


139. 小儿慢惊风脾虚肝亢证，治疗应首选 

140. 小儿慢惊风阴虚风动证，治疗应首选 

(141~142 题共用选项)

A. 黏液便


B. 水样便 

C. 蛋花样便 

D. 豆渣样便

E. 果浆样大便


141. 霍乱多见 


142. 菌痢多见 

(143~144 题共用选项)

A. 痢疾志贺菌


B. 福氏志贺菌

C. 宋内志贺菌 

D. 鲍氏志贺菌 

E. 舒氏志贺菌

143. 感染后病情最重的痢疾杆菌是

144. 感染后病情较轻的痢疾杆菌是 

(145~146 题共用选项)

A. 母婴

B. 空气

C. 蚊虫

D. 土壤

E. 水、食物

145. 可传播传染性非典型肺炎的是

146. 可传播流行性脑脊髓膜炎的是

(147~148 题共用选项)

A. 鼠疫、霍乱

B. 狂犬病、流行性乙型脑炎

C. 登革热、炭疽

D. 阿米巴性痢疾、肺结核

E. 黑热病、包虫病

147. 丙类传染病是

148. 甲类传染病是

(149~150 题共用选项)

A. 大便涂片镜检

B. 痰涂片镜检

C. 胸水涂片镜检

D. 脑脊液涂片镜检

E. 血液涂片镜检

149. 流脑实验室检查首选

150. 阿米巴痢疾实验室检查首选

中医执业医师-模拟试卷（第四单元）答案及解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】D

【答案解析】白疔（寻常型）之血热内蕴证

证候：多见于进行期。皮疹多呈点滴状，发展迅速，颜色鲜红，层层鳞屑，瘙痒剧烈，刮去鳞屑有点状出血；伴口干舌燥，咽喉疼痛，心烦易怒，便干溲赤，舌质红，舌苔薄黄，脉弦滑或数。

治法：清热凉血，解毒消斑。

Commented [宋纪显 2]:

方药：犀角地黄汤加减。

2. 【正确答案】D

【答案解析】黄水疮治疗以清暑利湿为主要治法。

3. 【正确答案】B

【答案解析】脂溢性皮炎风热血燥证

证候：多发于头面部，为淡红色斑片，干燥、脱屑、瘙痒，受风加重，或头皮瘙痒，头屑多，毛发干枯脱落；伴口干口渴，大便干燥；舌质偏红，舌苔薄白或黄，脉细数。

治法：祛风清热，养血润燥。

方药：消风散合当归饮子加减。

4. 【正确答案】E

【答案解析】脂溢性皮炎之肠胃湿热证

证候：皮损为潮红斑片，有油腻性痂屑，甚至糜烂、渗出；伴口苦口黏，脘腹胀满，小便短赤，大便臭秽；舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。

治法：健脾除湿，清热止痒。

方药：参苓白术散合茵陈蒿汤。

5. 【正确答案】D

【答案解析】毛细血管瘤：多在出生后1~2个月内出现，部分在5岁左右自行消失，多发生在颜面、颈部，可单发，也可多发。多数表现为在皮肤上有红色丘疹或小的红斑，逐渐长大，界限清楚，大小不等，质软可压缩，色泽为鲜红色或紫红色，压之可褪色，抬手复原。

6. 【正确答案】E

【答案解析】千捶膏性偏寒凉，能消肿、解毒、提脓、祛腐、止痛。

7. 【正确答案】D

【答案解析】瘾疹之血虚风燥证

证候：反复发作，迁延日久，午后或夜间加剧；伴心烦易怒，口干，手足心热；舌红少津，脉沉细。

治法：养血祛风，润燥止痒。

方药：当归饮子加减。

8. 【正确答案】B

【答案解析】烧伤面积的计算：

手掌法：伤员本人五指并拢时，一只手掌的面积占体表面积的 1%。此法常用于小面积或散在烧伤的计算。

9. 【正确答案】B

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】破伤风，前驱期：

 医学教育网
www.med66.com

一般 1~2 天，患者常有头痛、头晕、乏力、多汗、烦躁不安、打呵欠，下颌微感紧张酸胀，咀嚼无力，张口略感不便；伤口往往干陷无脓，周围皮肤暗红，创口疼痛并有紧张牵制感。


10. 【正确答案】B

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】“呈带状分布的红斑上成簇的水疱”是蛇串疮的特点；

“大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退”是瘾疹的特点；

“皮肤上浅在性脓疱和脓痂”是黄水疮的特点； 医学教育网
www.med66.com

“皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑”是脂溢性皮炎的特点；

“对称分布，多形损害，剧烈瘙痒”是湿疹的特点。


11. 【正确答案】E

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】有头疽的病因病机：外感风温、湿热邪毒，凝聚肌表，以致气血运行失常而成；或情志内伤，恼怒伤肝，思虑伤脾，肝脾郁结，气郁化火；或房事不节，恣欲伤肾，劳伤精气，肾水亏损，相火炽盛；或恣食膏粱厚味，脾胃运化失常，湿热火毒内生，均能导致脏腑蕴毒而发。

12. 【正确答案】B

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】烧伤中国九分法：将全身体表面积分为 11 个 9 等份。成人头、面、颈部为 9%；双上肢为 2×9%；躯干前后包括外阴部为 3×9%；双下肢包括臀部为 5×9%+1%=46%。

13. 【正确答案】A

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】前列腺增生之湿热下注证

证候：小便频数黄赤，尿道灼热或涩痛，排尿不畅，甚或点滴不通，小腹胀满，或大便干燥，口苦口黏。舌暗红，苔黄腻，脉滑数或弦数。

治法：清热利湿，消癥通闭。

 医学教育网
方药：八正散加减。

 医学教育网
www.med66.com

14. 【正确答案】B

【答案解析】托盘疔：多发生于手掌，初起整个手掌肿胀高突，失去正常的掌心凹陷或稍凸

出，手背肿势通常更为明显，甚则延及手臂，疼痛剧烈，或伴发红丝疔。

15. 【正确答案】E

【答案解析】“疮色晦暗不泽，皮温较低”考虑寒邪较重，而非热胜之证，所以不适用清热法。

16. 【正确答案】C

【答案解析】辨脓方法有：

接触法，适应证：表浅脓肿。成脓指征：应指。

穿刺法，适应证：体表深部或内脏脓肿。成脓指征：穿刺有脓。

透光法，适应证：指（趾）的化脓。成脓指征：局部有深黑色阴影为有脓。

点压法，适应证：指（趾）化脓但脓液很少的情况下；成脓指征：有局限性的剧痛点。

B 超：可比较准确地确定脓肿部位，并判断脓肿大小，引导穿刺或切开排脓。

17. 【正确答案】D

【答案解析】肛裂临床上以肛门周期性疼痛、出血、便秘为主要特点。

18. 【正确答案】E

【答案解析】乳癖冲任失调证

证候：多见于中年妇女。乳房肿块月经前加重，经后缓减。伴有腰酸乏力，神疲倦怠，月经失调，量少色淡，或闭经。舌淡，苔白，脉沉细。

治法：调摄冲任。

方药：二仙汤合四物汤加减。

二仙汤合开郁散治疗的是乳岩冲任失调证。

19. 【正确答案】E

【答案解析】脾胃者，仓廪之官。饮食不节，脾胃当最先受损，日久最易化生湿热火毒之邪。

20. 【正确答案】B

【答案解析】蛇串疮是一种皮肤上出现成簇水疱，多呈带状分布，痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。

21. 【正确答案】A

【答案解析】压迫性溃疡（缺血性溃疡）：初期皮肤暗紫，很快变黑并坏死，滋水、液化、腐烂，脓液有臭味，可深及筋膜、肌肉、骨膜。多见于褥疮。

疮疡性溃疡：疮口多呈凹陷形或潜行空洞或漏管，疮面肉色不鲜，脓水清稀，并夹有败絮状

物，疮口愈合缓慢或反复溃破，经久难愈。

梅毒性溃疡：多呈半月形，创面边缘整齐，坚硬削直如凿，基底高低不平，有稀薄臭秽分泌物。

岩性溃疡：疮面翻花如岩状，有的在溃疡底部见有珍珠样结节，内有紫黑坏死组织，渗流血水，伴腥臭味。

22. 【正确答案】A

【答案解析】岩性溃疡，疮面多呈翻花如岩穴，有的在溃疡底部见有珍珠样结节，内有紫黑坏死组织，渗流血水，伴腥臭味。

23. 【正确答案】C

【答案解析】火陷证，当凉血清热解毒为主，并顾护津液，干陷证，当补养气血，托毒透邪，虚陷证，当温补脾胃或生津养胃。

24. 【正确答案】D

【答案解析】砭镰疗法，适用于急性阳证疮疡，如下肢丹毒、红丝疔、疔疮痈肿初起、外伤瘀血肿痛、痔疮肿痛等。

25. 【正确答案】A

【答案解析】子癍临床表现：溃破后脓液清稀，或夹有豆腐渣样絮状物，易形成反复发作、经久不愈的窦道。

26. 【正确答案】E

【答案解析】阴疮之寒湿证

主要证候：阴部肌肤肿溃，触之坚硬，色晦黯不泽，日久不愈，脓水淋漓，疼痛绵绵；伴面色（白光）白，精神不振，疲乏无力，畏寒肢冷，食少纳呆；舌淡苔白腻，脉沉细缓。

治法：温经散寒，除湿消疮

方药：阳和汤或托里消毒散。

27. 【正确答案】E

【答案解析】经断复来湿毒瘀结证

主要证候：绝经后复见阴道出血，量少，淋漓不断，夹有杂色带下，恶臭，小腹疼痛，低热起伏，神疲，形体消瘦；舌质黯，或有瘀斑，苔白腻，脉细弱。

治法：利湿解毒，化瘀散结。

方药：萆薢渗湿汤合桂枝茯苓丸加减。

28. 【正确答案】B

【答案解析】绝经前后诸证肾阴阳俱虚证

主要证候：经断前后，月经紊乱，量少或多；乍寒乍热，烘热汗出，头晕耳鸣，健忘，腰背冷痛；舌淡，苔薄，脉沉弱。

治法：阴阳双补。

方药：二仙汤合二至丸加减。

29. 【正确答案】A

【答案解析】闭经痰湿阻滞证

主要证候：月经延后，经量少、色淡质黏腻，渐至月经停闭；伴形体肥胖，胸闷泛恶，神疲倦怠，纳少，痰多，或带下量多、色白；苔腻，脉滑。

治法：健脾燥湿化痰，活血调经。

方药：四君子汤合苍附导痰丸加当归、川芎。

30. 【正确答案】C

【答案解析】妊娠的生理现象：(1) 月经停闭；(2) 脉滑；(3) 妊娠反应；(4) 子宫增大；(5) 乳房变化；(6) 下腹膨隆。

31. 【正确答案】C

【答案解析】慢性盆腔炎气滞血瘀证

主要证候：少腹部胀痛或刺痛，经行腰腹疼痛加重，经血量多有块，瘀块排出则痛减，带下量多，婚久不孕；经行情志抑郁，乳房胀痛；舌体紫黯，有瘀斑、瘀点，苔薄，脉弦涩。

治法：活血化瘀，理气止痛。

方药：膈下逐瘀汤。

32. 【正确答案】E

【答案解析】子晕脾虚肝旺证

主要证候：妊娠中晚期，头晕头重目眩，胸闷心烦，呕逆泛恶，面浮肢肿，倦怠嗜睡；苔白腻，脉弦滑。

治法：健脾化湿，平肝潜阳。

方药：半夏白术天麻汤加味。





33. 【正确答案】C

【答案解析】产后恶露不绝的主要病机是胞宫藏泻失度，冲任不固，血海不宁。常见病因有

气虚、血热、血瘀。



34. 【正确答案】E

【答案解析】妊娠恶阻之肝胃不和证

主要证候：妊娠早期， 恶心，呕吐酸水或苦水， 恶闻油腻， 烦渴， 口干口苦，头胀而晕，胸满胁痛，嗳气叹息；舌淡红，苔微黄，脉弦滑。

35. 【正确答案】E

【答案解析】产后腹痛之气血两虚证



主要证候：产后小腹隐隐作痛数日不止，喜按喜揉，恶露量少，色淡红，质稀无块，面色苍白， 头晕眼花， 心悸怔忡，大便干结；舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：补血益气，缓急止痛。

方药：肠宁汤或内补当归建中汤或当归生姜羊肉汤。

36. 【正确答案】B

【答案解析】崩漏之实热证

主要证候：经来无期，经血突然暴崩如注，或淋漓日久难止，血色深红， 质稠； 口渴烦热，便秘潮黄；舌红，苔黄，脉滑数。

治法：清热凉血，固冲止血。

方药：清热固经汤。

37. 【正确答案】E

【答案解析】阴挺之肾虚证



主要证候：子宫下脱，日久不愈；头晕耳鸣，腰膝酸软冷痛，小腹下坠，小便频数，入夜尤甚，带下清稀；舌淡红，脉沉弱。

治法：补肾固脱，益气升提。

方药：大补元煎加黄芪。

38. 【正确答案】D

【答案解析】经间期出血之湿热证

主要证候：两次月经中间，阴道出血量稍多，色深红，质黏腻，无血块。平时带下量多色黄， 小腹时痛， 神疲乏力，骨节酸楚，胸闷烦躁，口苦咽干，纳呆腹胀，小便短赤；舌质红，苔黄腻，脉细弦或滑数。

治法：清利湿热，固冲止血。

方药：清肝止淋汤加減。

39. 【正确答案】D

【答案解析】子宫从正常位置沿阴道下降，宫颈外口达坐骨棘水平以下，甚至子宫全部脱出于阴道口以外，称“阴挺”。常合并阴道前壁和后壁膨出。也称“阴脱”、“阴菌”、“阴痔”、“产肠不收”、“葫芦（疝颓）”。本病相类于西医的“子宫脱垂”。

40. 【正确答案】D

【答案解析】阴疮之热毒证
主要证候：外阴部皮肤局限性鲜红肿胀，破溃糜烂，灼热结块，脓苔稠黏，或脓水淋漓；全身见身热心烦，口干纳少，便秘尿黄；舌红苔黄腻，脉弦滑数。

治法：清热利湿，解毒消疮

方药：龙胆泻肝汤。

41. 【正确答案】A

【答案解析】带下过少之血枯瘀阻证
主要证候：带下过少，甚至全无，阴中干涩，阴痒；或面色无华，头晕眼花，心悸失眠，神疲乏力，或经行腹痛，经色紫黯，有血块，肌肤甲错，或下腹有包块，舌质黯，边有瘀点瘀斑，脉细涩。

治法：补血益精，活血化瘀。

方药：小营煎加丹参、桃仁、牛膝。

42. 【正确答案】D

【答案解析】胎漏、胎动不安血热证

主要证候：妊娠期阴道少量出血，色深红或鲜红，质稠，或腰酸，口苦咽干，心烦少寐，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。

治法：清热凉血，养血安胎。

方药：保阴煎或当归散。

43. 【正确答案】C

【答案解析】“宫缩痛”、“产后痛”，属生理现象，一般不需治疗。

44. 【正确答案】B_m

【答案解析】急惊风为痰、热、惊、风四证俱备，临床以高热、抽风、神昏为主要表现，多由外感时邪、内蕴湿热和暴受惊恐而引发。

45. 【正确答案】C

【答案解析】遗尿多与膀胱和肾的功能失调有关，其中尤以肾气不足、膀胱虚寒为多见。

46. 【正确答案】D

【答案解析】反复呼吸道感染，迁延期以扶正为主，兼以祛邪。恢复期当固本为要，或补气固表，或温卫和营，或温补脾肾，或滋养肺脾。

47. 【正确答案】C

【答案解析】口疳证

证候：口舌生疮，甚或满口糜烂，秽臭难闻，面赤心烦，夜卧不宁，小便短黄，或吐舌、弄舌，舌质红，苔薄黄，脉细数。

疳证病位主要在脾胃，口疳除了脾，还涉及到心。

48. 【正确答案】E

【答案解析】贫血之肝肾阴虚证

证候：面色皮肤黏膜苍白，爪甲色白易脆，发育迟缓，头晕目涩，两颧潮红，潮热盗汗，毛发枯黄，四肢震颤抽动，舌红，苔少或光剥，脉弦数或细数。

治法：滋养肝肾，益精生血。

代表方剂：左归丸。

49. 【正确答案】C

【答案解析】尿频之湿热下注证

证候：起病较急，小便频数短赤，尿道灼热疼痛，尿液淋漓混浊，小腹坠胀，腰部酸痛，婴儿则时时啼哭不安，常伴有发热、烦躁口渴、头痛身痛、恶心呕吐，舌质红，苔薄腻微黄或黄腻，脉数有力。

治法：清热利湿，通利膀胱。

方药：八正散。

50. 【正确答案】D

【答案解析】抽动障碍之气郁化火证

证候：面红耳赤，烦躁易怒，皱眉眨眼，张口歪嘴，摇头耸肩，发作频繁，抽动有力，口出异声秽语，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。

治法：清肝泻火，息风镇惊。

代表方剂：清肝达郁汤。

51. 【正确答案】A

【答案解析】硬肿症之病因病机：硬肿症的内因是肾阳虚衰，外因是感受寒邪。

52. 【正确答案】D

【答案解析】口疮发病年龄以 2~4 岁为多见，预后良好。

53. 【正确答案】E

【答案解析】口疳证

证候：口舌生疮，甚或满口糜烂，秽臭难闻，面赤心烦，夜卧不宁，小便短黄，或吐舌、弄舌，舌质红，苔薄黄，脉细数。

治法：清心泻火，滋阴生津。

代表方剂：泻心导赤散。

54. 【正确答案】B

【答案解析】夏季热又称暑热症，是婴幼儿在暑天发生的特有的季节性疾病，临床以长期发热、口渴多饮、多尿、少汗或汗闭为特征。

55. 【正确答案】D

【答案解析】夜啼主要因脾寒、心热、惊恐所致。其病位主要在心、脾。

56. 【正确答案】D

【答案解析】临床可用以下公式推算 2 岁后至 12 岁儿童的身高：身高（cm）=70+7×年龄。

57. 【正确答案】C

【答案解析】风痧之邪入气营证

证候：壮热口渴，烦躁哭闹，疹色鲜红或紫暗，疹点稠密，甚至可见皮疹融合成片或皮肤猩红，小便短黄，大便秘结，舌质红赤，苔黄糙，脉洪数。

治法：清气凉营解毒。

代表方剂：透疹凉解汤。

58. 【正确答案】A

【答案解析】麻疹收没期证候：麻疹出齐，发热渐退，咳嗽减轻，胃纳增加，皮疹依布发顺序渐回，皮肤可见糠麸样脱屑，并有色素沉着，舌红少津，苔薄净，脉细无力或细数。

59. 【正确答案】D

【答案解析】流行性出血热病后可获持久免疫。

60. 【正确答案】A

【答案解析】肺炎型流感多发生在2岁以下的小儿。

61. 【正确答案】E

【答案解析】乙脑止痉的处理: 因脑实质病变引起的抽搐, 可使用镇静剂, 首选地西洋。

62. 【正确答案】B

【答案解析】伤寒传染源: 少数患者病后可成为长期带菌者, 持续带菌超过3个月者称为慢性带菌者。

63. 【正确答案】B

【答案解析】急性细菌性痢疾典型表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重及黏液脓血便, 左下腹明显压痛, 而胃肠道症状轻微甚至无呕吐。

64. 【正确答案】B

【答案解析】乙型肝炎的预防: (1) 乙肝免疫球蛋白(HBIG)主要用于阻断HBV的母婴传播及意外暴露的被动免疫, 应在出生后或暴露后的24小时内(时间越早越好)注射。(2) 乙型肝炎疫苗主要用于新生儿和高危人群的乙肝预防。对HBsAg阳性产妇所生婴儿, 与乙肝免疫球蛋白联合使用可提高保护率。

65. 【正确答案】B

【答案解析】低效消毒法只能消灭细菌繁殖体、部分真菌和亲脂性病毒。物理低效消毒方法有通风换气、冲洗和洗手等; 化学低效消毒剂有氯己定(洗必泰)、苯扎溴铵(新洁尔灭)等。

66. 【正确答案】D

【答案解析】戊型肝炎: 存在流行和散发两种形式。流行主要发生于亚洲、非洲和中美洲的一些不发达国家。在我国成人急性病毒性肝炎中, 多数地区戊型肝炎已占首位, 尤其是老年人戊型肝炎所占比例更高。多发生于雨季或洪水泛滥之后。散发病例一年四季均可发生。

67. 【正确答案】B

【答案解析】菌痢的主要病变部位是乙状结肠和直肠。

68. 【正确答案】C

【答案解析】对流感密切接触者可用复方磺胺甲噁唑预防。

69. 【正确答案】A

【答案解析】在我国长期流行菌群为A群, C群流行也增多。

70. 【正确答案】D

Commented [宋纪显 3]:

【答案解析】流行性出血热的发病机制（1）病毒的直接作用；（2）免疫损伤作用。

71. 【正确答案】D

【答案解析】流行性出血热多尿期一般出现在病程第9~14日，持续时间一般为7~14日，短者1日，长者可达数月之久。本期肾脏损害逐渐修复，肾小球滤过功能恢复，但由于肾小管重吸收功能尚未完全恢复，加上尿素氮等代谢产物潴留引起高渗性利尿作用，以致尿量显著增多。在本期水电解质紊乱达到高峰，常见低钠血症、低钾血症，甚至可再次引发休克。

72. 【正确答案】A

【答案解析】传染病的预防：1. 管理传染源，2. 切断传播途径，3. 保护易感人群。

73. 【正确答案】B

【答案解析】流行：某种传染病在某一地区的发病率高于一般水平。

74. 【正确答案】E

【答案解析】以防蚊、灭蚊及预防接种为预防乙脑的关键。

75. 【正确答案】A

【答案解析】流感病毒核酸分节段的结构特点使其具有较高的基因重配频率，因而其抗原性容易发生变异，并导致新亚型病毒的出现。

76. 【正确答案】D

【答案解析】如果肝实质广泛而严重损伤时，肝脏产生凝血因子减少，PT明显延长，PTA下降。

77. 【正确答案】C

【答案解析】散发：某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平。

78. 【正确答案】C

【答案解析】伤寒预防：患者应及早隔离治疗，体温正常15日后，大便培养每周1次，连续2次阴性方可解除隔离。患者及带菌者的排泄物、用具等应严格消毒。

二、A2型题

79. 【正确答案】E

【答案解析】尖锐湿疣之湿毒下注证
证候：外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，色灰或褐或淡红，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。

治法：利湿化浊，清热解毒。

方药：萆薢化毒汤酌加黄柏、土茯苓、大青叶。

80. 【正确答案】A

【答案解析】脱肛，湿热下注证

肛内肿物脱出，色紫黯或深红，甚则表面溃破、糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿。

方药：萆薢渗湿汤加减。出血多者，加地榆、槐花、侧柏炭。

81. 【正确答案】B

【答案解析】脱疽，其临床特点是好发于四肢末端，以下肢多见，初起患肢末端发凉、怕冷，苍白，麻木，可伴间歇性跛行，继则疼痛剧烈，日久患趾（指）坏死变黑，甚至趾（指）节脱落。部分患者起病急骤，进展迅速，预后严重，需紧急处理。

82. 【正确答案】E

【答案解析】白秃疮相当于西医的白癣。

本病是头癣的一种，多见于学龄儿童，男性多于女性。皮损特征是在头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片。病损区毛发干枯无泽，常在距头皮0.3~0.8cm处折断而呈参差不齐。头发易于脱落且不疼痛，病发根部包绕有白色鳞屑形成的菌鞘。自觉瘙痒。发病部位以头顶、枕部居多，但发缘处一般不被累及。青春期可自愈，秃发也能再生，不遗留疤痕。

83. 【正确答案】E

【答案解析】失荣之气血两亏证

证候：颈部肿块溃破以后，长期渗流血，不能愈合，疮面苍白水肿，肉芽高低不平，秽肉翻花。伴低热，乏力，消瘦等。舌质淡，苔白或无苔，脉沉细。

治法：补益气血，解毒化痰。

方药：八珍汤合四妙勇安汤加减。

84. 【正确答案】C

【答案解析】乳房处应循乳络方向做放射状切口。

85. 【正确答案】E

【答案解析】带下过多湿热下注证

主要证候：带下量多，色黄或呈脓性，质黏稠，有臭气，或带下色白质黏，呈豆渣样，外阴瘙痒；小腹作痛，口苦口腻，胸闷纳呆，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清利湿热，佐以解毒杀虫。


方药：止带方。

86. 【正确答案】B

 医学教育网
www.med66.com
【答案解析】月经后期实寒证

 医学教育网
www.med66.com

主要证候：月经周期延后，量少，色黯有块，小腹冷痛拒按，得热痛减；畏寒肢冷，或面色青白；舌质淡黯，苔白，脉沉紧。

治法：温经散寒调经。 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

方药：温经汤（《妇人大全良方》）。

87. 【正确答案】E

 医学教育网
www.med66.com
【答案解析】崩漏之虚热证

 医学教育网
www.med66.com

主要证候：经来无期，量少淋漓不尽或量多势急，血色鲜红；面颊潮红，烦热少寐，咽干口渴，便结，舌红，少苔，脉细数。

治法：养阴清热，固冲止血。

方药：上下相资汤。 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

88. 【正确答案】A

【答案解析】阴痒之肝肾阴虚证

主要证候：阴部瘙痒难忍，干涩灼热，夜间加重，或会阴部肤色变浅白，皮肤粗糙，皲裂破溃；眩晕耳鸣，五心烦热，烘热汗出，腰酸腿软，口干不欲饮；舌红苔少，脉细数无力。

治法：滋阴补肾，清肝止痒。

方药：知柏地黄汤加当归、栀子、白鲜皮。

89. 【正确答案】A

【答案解析】经行情志异常肝经郁热证

主要证候：经前或经期，烦躁易怒，或抑郁不乐，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红；舌红，苔黄，脉弦数。

治法：清肝泄热，解郁安神。

方药：丹栀逍遥散加减。

 医学教育网
www.med66.com
90. 【正确答案】A

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】月经后期之血虚证

主要证候：周期延后，量少，色淡红，质清稀，或小腹绵绵作痛；或头晕眼花，心悸少寐，

面色苍白或萎黄；舌质淡红，脉细弱。

治法：补血益气调经。

方药：大补元煎。

91. 【正确答案】A

【答案解析】不孕症之瘀滞胞宫证

主要证候：婚久不孕，月经多推后或周期正常，经来腹痛，甚或呈进行性加剧，经量多少不一，经色紫黯，有血块，块下痛减；有时经行不畅，淋漓难净，或经间出血；或肛门坠胀不适，性交痛；舌质紫暗或舌边有瘀点，苔薄白，脉弦或弦细涩。

治法：逐瘀荡胞，调经助孕。

方药：少腹逐瘀汤或隔下逐瘀汤。

92. 【正确答案】C

【答案解析】根据患者表现诊断为癥瘕之湿热瘀阻证

主要证候：下腹部肿块，热痛起伏，触之痛剧，痛连腰骶，经血量多，经期延长，带下量多，色黄如脓，或赤白兼杂；兼见身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤；舌黯红，有瘀斑，苔黄，脉弦滑数。

治法：清热利湿，化瘀消癥。

方药：大黄牡丹汤。

93. 【正确答案】A

【答案解析】经期延长之气虚证

主要证候：经血过期不净，量多，色淡，质稀；倦怠乏力，气短懒言，小腹空坠，面色（白光）白；舌淡，苔薄，脉缓弱。

治法：补气摄血，固冲调经。

方药：举元煎加减。

94. 【正确答案】E

【答案解析】小儿贫血的西医治疗：使用铁剂治疗。一般用硫酸亚铁口服，每次 5~10mg/kg，1 日 2~3 次，同时口服维生素 C 有助吸收，服用至血红蛋白达正常水平后 2 个月左右再停药。

95. 【正确答案】E

【答案解析】硬肿症之寒凝血涩证

证候 全身欠温，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，硬肿多局限于臀、小腿、臂、面颊等部位，色暗红、青紫，或红肿如冻伤，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，或伴呼吸不匀，气息微弱，指纹紫滞。

治法：温经散寒，活血通络。

代表方剂：当归四逆汤。

96. 【正确答案】D

【答案解析】风寒泻证

证候 大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。

治法：疏风散寒，化湿和中。

代表方剂：藿香正气散。

97. 【正确答案】E

【答案解析】注意力缺陷多动障碍之肝肾阴虚证

证候：多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，注意力不集中，难以静坐，或有记忆力欠佳、学习成绩低下，或有遗尿、腰酸乏力，或有五心烦热、盗汗、大便秘结，舌质红，舌苔薄，脉细弦。

治法：滋养肝肾，平肝潜阳。

代表方剂：杞菊地黄丸。

98. 【正确答案】A

【答案解析】惊痫证

证候 起病前常有惊吓史。发作时惊叫，吐舌，急啼，神志恍惚，面色时红时白，惊惕不安，如人将捕之状，四肢抽搐，舌淡红，舌苔白，脉弦滑，乍大乍小，指纹色青。

治法：镇惊安神。

代表方剂：镇惊丸。

99. 【正确答案】D

【答案解析】小儿急惊风之风热动风证

证候 起病急躁，常突然出现神昏惊厥，伴发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛，随即出现烦躁、神昏、惊风，舌苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热，息风定惊。

代表方剂：银翘散。

100. 【正确答案】E

【答案解析】猩红热之毒炽气营证

症候：壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，甚则色紫如瘀点，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，见疹后的 1~2 天舌苔黄糙，舌质起红刺，3~4 天后舌苔剥落，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。

治法：清气凉营，泻火解毒。

代表方剂：凉营清气汤。

101. 【正确答案】D

【答案解析】汗证之湿热迫蒸证

证候：汗出过多，以额、心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热泻脾。

代表方剂：泻黄散。

102. 【正确答案】D

【答案解析】紫癜之气不摄血证

证候：起病缓慢，病程迁延，紫癜反复出现。瘀斑、瘀点颜色淡紫，常有鼻衄、齿衄，面色苍黄，神疲乏力，食欲不振，头晕心慌，舌淡苔薄，脉细无力。

治法：健脾养心，益气摄血。

代表方剂：归脾汤。

103. 【正确答案】D

【答案解析】小儿硬肿症之寒凝血涩证

证候：全身欠温，四肢发凉，肌肤硬肿，难以捏起，硬肿多局限于臀、小腿、臂、面颊等部位，色暗红、青紫，或红肿如冻伤，哭声较低，精神萎靡，反应尚可，或伴呼吸不匀，气息微弱，指纹紫滞。

治法：温经散寒，活血通络。

代表方剂：当归四逆汤。

三、A3/A4 型题

(104~106 题共用题干)

104. 【正确答案】D

【答案解析】乳痈热毒炽盛证

证候：乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感。或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。

治法：清热解毒，托里透脓。

方药：透脓散加味。

105. 【正确答案】D

【答案解析】乳痈热毒炽盛证

证候：乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感。或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。

治法：清热解毒，托里透脓。

方药：透脓散加味。

106. 【正确答案】E

【答案解析】乳痈热毒炽盛证

证候：乳房肿痛，皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感。或切开排脓后引流不畅，红肿热痛不消，有“传囊”现象。壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。

治法：清热解毒，托里透脓。

方药：透脓散加味。

(107~109 题共用题干)

107. 【正确答案】B

【答案解析】经行乳房胀痛肝气郁结证

主要证候：经前或经行乳房胀满疼痛，或乳头痒痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色黯红，小腹胀痛，胸闷胁胀，精神抑郁，时叹息，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃通络。

方药：逍遥散加麦芽、青皮、鸡内金。

108. 【正确答案】C

【答案解析】经行乳房胀痛肝气郁结证

主要证候：经前或经行乳房胀满疼痛，或乳头痒痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色黯红，小腹胀痛，胸闷胁胀，精神抑郁，时叹息，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃通络。

方药：逍遥散加麦芽、青皮、鸡内金。


109. 【正确答案】A

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】经行乳房胀痛肝气郁结证

 医学教育网
www.med66.com

主要证候 经前或经行乳房胀满疼痛，或乳头痒痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色黯红，小腹胀痛，胸闷胁胀，精神抑郁，时叹息，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃通络。 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

方药：逍遥散加麦芽、青皮、鸡内金。

(110~112 题共用题干)


110. 【正确答案】E

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】痰热咳嗽证

证候 咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。

治法：清热化痰，宣肺止咳。 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

代表方剂：清金化痰汤、清气化痰汤。

111. 【正确答案】D

【答案解析】痰热咳嗽证


 医学教育网
www.med66.com

证候 咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。

治法：清热化痰，宣肺止咳。

代表方剂：清金化痰汤、清气化痰汤。

112. 【正确答案】A

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】痰热咳嗽证

证候 咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。

治法：清热化痰，宣肺止咳。

代表方剂：清金化痰汤、清气化痰汤。 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

四、B 型题

(113~114 题共用选项)

113. 【正确答案】B

【答案解析】白疔湿毒蕴阻证

证候：皮损多发生在腋窝、腹股沟等皱褶部位，红斑糜烂，痂屑黏厚，瘙痒剧烈；或掌跖红斑、脓疱、脱皮；或伴关节酸痛、肿胀、下肢沉重；舌质红，苔黄腻，脉滑。

治法：清利湿热，解毒通络。

方药：萆薢渗湿汤加减。

114. 【正确答案】D

【答案解析】白疔火毒炽盛证

证候：全身皮肤潮红、肿胀、灼热痒痛，大量脱皮，或有密集小脓疱 伴壮热、口渴、头痛、畏寒，大便干燥，小便黄赤；舌红绛，苔黄腻，脉弦滑数。

治法：清热泻火，凉血解毒。

方药：清瘟败毒饮加减。

(115~116 题共用选项)

115. 【正确答案】E

【答案解析】瘾疹之风寒束表证

证候：风团色白，遇寒加重，得暖则减；恶寒怕冷，口不渴；舌淡红，苔薄白，脉浮紧。

治法：疏风散寒止痒。

方药：麻黄桂枝各半汤加减。

116. 【正确答案】D

【答案解析】瘾疹之风热犯表证

证候：风团鲜红，灼热剧痒，遇热加重，得冷则减；伴有发热，恶寒，咽喉肿痛；舌质红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热止痒。

方药：消风散加减。

(117~118 题共用选项)

117. 【正确答案】B

【答案解析】接触性皮炎风热蕴肤证

证候：起病较急，好发于头面部，皮损色红，肿胀轻，其上为红斑或丘疹，自觉瘙痒，灼热心烦，口干，小便微黄；舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热止痒。

方药：消风散加减。


118. 【正确答案】D

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】接触性皮炎湿热毒蕴证

 医学教育网
www.med66.com

证候 起病急骤，皮损面积较广泛，其色鲜红肿胀，上有水泡或大疱，水泡破后则糜烂渗液，自觉灼热瘙痒；伴发热，口渴，大便干，小便短黄；舌红，苔黄，脉弦滑数。

治法：清热祛湿，凉血解毒。 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

方药：龙胆泻肝汤合化斑解毒汤加减。

(119~120 题共用选项)


119. 【正确答案】D

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】恶露量多或少、色紫红、有块、小腹痛拒按，多属血瘀；恶露量多、色红有臭气，多属血热；恶露量多、色淡质稀、神疲乏力，多属气虚；产后大便干涩难下，大多属津血不足；乳汁甚少、质稀薄，食少神疲、面色无华者，多属气血虚弱。

120. 【正确答案】A


 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】恶露量多或少、色紫红、有块、小腹痛拒按，多属血瘀；恶露量多、色红有臭气，多属血热；恶露量多、色淡质稀、神疲乏力，多属气虚；产后大便干涩难下，大多属津血不足；乳汁甚少、质稀薄，食少神疲、面色无华者，多属气血虚弱。

(121~122 题共用选项)


121. 【正确答案】C

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】肾气虚，封藏失职，冲任不固，可致月经先期、月经过多、崩漏、产后恶露不绝；肾气虚，胎失所系，冲任不固，可致胎漏、胎动不安、滑胎；肾气虚，摄纳或系胞无力，则致胎动不安、子宫脱垂。

122. 【正确答案】E


 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】肾气虚，封藏失职，冲任不固，可致月经先期、月经过多、崩漏、产后恶露不绝；肾气虚，胎失所系，冲任不固，可致胎漏、胎动不安、滑胎；肾气虚，摄纳或系胞无力，则致胎动不安、子宫脱垂。

(123~124 题共用选项)

123. 【正确答案】B

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】月经过少之血瘀证

主要证候：经行涩少，色紫黯，有血块；小腹胀痛，血块排出后胀痛减轻；舌紫黯，或有瘀斑、瘀点，脉沉弦或沉涩。

治法：活血化瘀调经。

方药：桃红四物汤或通瘀煎。

124. 【正确答案】D

【答案解析】月经过少之痰湿证

主要证候：经行量少，色淡红，质黏腻如痰；形体肥胖，胸闷呕恶，或带多黏腻；舌淡，苔白腻，脉滑。

治法：化痰燥湿调经。

方药：苍附导痰丸或二陈加芎归汤。

(125~126 题共用选项)

125. 【正确答案】B

【答案解析】经间期出血之脾气虚证

主要证候：经间期出血，量少，色淡，质稀，神疲体倦，气短懒言，食少腹胀，舌淡，苔薄，脉缓弱。

治法：健脾益气，固冲摄血。

方药：归脾汤。

126. 【正确答案】A

【答案解析】经间期出血之湿热证

主要证候：两次月经中间，阴道出血量稍多，色深红，质黏腻，无血块。平时带下量多色黄，小腹时痛；神疲乏力，骨节酸楚，胸闷烦躁，口苦咽干，纳呆腹胀，小便短赤；舌质红，苔黄腻，脉细弦或滑数。

治法：清利湿热，固冲止血。

方药：清肝止淋汤加减。

(127~128 题共用选项)

127. 【正确答案】B

【答案解析】经行发热肝肾阴虚证

主要证候：经期或经后，午后潮热，月经量少，色红；两颧红赤，五心烦热，烦躁少寐；舌红而干，脉细数。

治法：滋养肝肾，育阴清热。


方药：蒿芩地丹四物汤。

128. 【正确答案】C

 医学教育网
www.med66.com
【答案解析】经行发热血气虚弱证

 医学教育网
www.med66.com

主要证候：经行或经后发热，热势不扬，动则自汗出，经量多，色淡质薄；神疲肢软，少气懒言；舌淡，苔白润，脉虚缓。

治法：补益血气，甘温除热。 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

方药：补中益气汤。

(129~130 题共用选项)

129. 【正确答案】D

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】蛔虫病辨证治疗。

肠虫证

症状：轻者可无症状，或时有绕脐腹痛，食欲不振，日渐消瘦，大便不调；重者，面色萎黄，形体消瘦，腹部疼痛，时作时止可见面部白斑，白睛蓝斑，唇内粟状白点，大便下虫，或粪便镜检有蛔虫卵，舌苔薄腻或花剥，脉象滑数。

治法：驱蛔杀虫，调理脾胃。

主方：使君子散加减。

130. 【正确答案】A

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】蛔虫病辨证治疗。

蛔厥证

症状：腹痛时发时止，突然发生剧烈腹痛，以右上腹或剑突下疼痛为主，弯腰曲背，辗转不安，肢冷汗出，恶心呕吐，常吐蛔虫。发作间歇时，痛止如常人。重者，腹痛持续不止，时轻时剧，畏寒发热，甚则出现黄疸。舌质红，舌苔厚腻，脉象弦数或滑数。

治法：安蛔定痛，继之驱虫。

主方：乌梅丸加减。

(131~132 题共用选项)

131. 【正确答案】D

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】疳积证

证候：形体明显消瘦，面色萎黄，肚腹膨胀，甚则青筋暴露，毛发稀疏结穗，性情烦躁，夜

卧不宁，或见揉眉挖鼻，吮指磨牙，动作异常，食欲不振，或善食易饥，或嗜食异物，舌淡苔腻，脉沉细而滑。

治法：消积理脾。

代表方剂：肥儿丸。

132. 【正确答案】A

【答案解析】口疳证

证候：口舌生疮，甚或满口糜烂，秽臭难闻，面赤心烦，夜卧不宁，小便短黄，或吐舌、弄舌，舌质红，苔薄黄，脉细数。

治法：清心泻火，滋阴生津。

代表方剂：泻心导赤散。

(133~134 题共用选项)

133. 【正确答案】D

【答案解析】厌食之脾胃气虚证

证候：不思进食，食而不化，大便溏薄夹不消化食物，面色少华。形体偏瘦，肢倦乏力，舌质淡，苔薄白，脉缓无力。

治法：健脾益气，佐以助运。

代表方剂：异功散、参苓白术散。

134. 【正确答案】E

【答案解析】厌食之脾胃阴虚证

证候：不思进食，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄，甚或烦躁少寐，手足心热，舌红少津，苔少或花剥，脉细数。

治法：滋脾养胃，佐以助运。

代表方剂：养胃增液汤、益胃汤。

(135~136 题共用选项)

135. 【正确答案】C

【答案解析】水肿之风水相搏证

证候：水肿大都先从眼睑开始，继而四肢。甚则全身浮肿，来势迅速，颜面为甚，皮肤光亮，按之凹陷即起，尿少或有尿血，伴发热恶风，咽痛身痛，苔薄白，脉浮。

治法：疏风解表，利水消肿。

代表方剂：麻黄连翘赤小豆汤。


A 选项是水毒内闭证；B 选项是水凌心肺证；E 选项是邪陷心肝证。

136. 【正确答案】D

 医学教育网
【答案解析】水肿之湿热内侵证



证候：浮肿或轻或重，小便黄赤短少或见尿血，伴脓疱疹、疔肿、丹毒等，发热口渴，烦躁，头痛头晕，大便干结，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热解毒，利水消肿。 医学教育网
www.med66.com



代表方剂：五味消毒饮合五皮饮。


(137~138 题共用选项)

 医学教育网
137. 【正确答案】E



【答案解析】奶麻之邪郁肌表证

证候：骤发高热，持续 3~4 天，神情正常或稍有烦躁，饮食减少，偶有囟填，或见抽风，咽红，舌质偏红，苔薄黄，指纹浮紫。


治法：疏风清热，宣透邪毒。 医学教育网
www.med66.com



代表方剂：银翘散。

138. 【正确答案】B


【答案解析】奶麻之毒透肌肤证

 医学教育网
证候：身热已退，肌肤出现玫瑰红色小丘疹，皮疹始见于躯干部，很快延及全身，约经 1~2 天皮疹消退，肤无痒感，或有口干、纳差，舌质偏红，苔薄少津，指纹淡紫。

治法：清热生津，以助康复。

代表方剂：银翘散合养阴清肺汤。

(139~140 题共用选项)

 医学教育网
139. 【正确答案】E



【答案解析】慢惊风脾虚肝亢证

证候：精神萎靡，嗜睡露睛，面色萎黄，不欲饮食，大便稀溏，色带青绿，时有肠鸣，四肢不温，抽搐无力，时作时止，舌淡苔白，脉沉弱。

 医学教育网
治法：温中健脾，缓肝理脾。 医学教育网
www.med66.com



代表方剂：缓肝理脾汤。

140. 【正确答案】A

【答案解析】慢惊风阴虚风动证

证候 精神疲惫，形容憔悴，面色萎黄或时有潮红，虚烦低热，手足心热，易出汗，大便干结，肢体拘挛或强直，抽搐时轻时重，舌绛少津，苔少或无苔，脉细数。

治法：育阴潜阳，滋肾养肝。

代表方剂：大定风珠。

(141~142 题共用选项)

141. 【正确答案】B

【答案解析】霍乱多以剧烈腹泻开始，病初大便尚有粪质，迅速成为黄色水样便或米泔水样便，无粪臭，每日可达数十次，甚至失禁。

142. 【正确答案】A

【答案解析】菌痢粪便外观为黏液、脓血便。

(143~144 题共用选项)

143. 【正确答案】A

【答案解析】痢疾志贺菌感染病情较重，福氏志贺菌感染易转为慢性，宋内志贺菌感染病情轻，多不典型。我国的优势血清型为福氏 2a、宋内氏、痢疾 I 型，其他血清型相对比较少见。宋内志贺菌抵抗力最强，福氏志贺菌次之，痢疾志贺菌最弱。

144. 【正确答案】C

【答案解析】痢疾志贺菌感染病情较重，福氏志贺菌感染易转为慢性，宋内志贺菌感染病情轻，多不典型。我国的优势血清型为福氏 2a、宋内氏、痢疾 I 型，其他血清型相对比较少见。宋内志贺菌抵抗力最强，福氏志贺菌次之，痢疾志贺菌最弱。

(145~146 题共用选项)

145. 【正确答案】B

【答案解析】传染性非典型肺炎的传播途径为空气飞沫传播和接触传播。

146. 【正确答案】B

【答案解析】流行性脑脊髓膜炎的传播途径为呼吸道飞沫直接传播。

(147~148 题共用选项)

147. 【正确答案】E

【答案解析】丙类传染病是指 流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻疹、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病，除霍乱、细菌性和阿米巴性痢

Commented [宋纪显 4]:

疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

148. 【正确答案】A

【答案解析】甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。

 医学教育网
(149~150 题共用选项)

 医学教育网
www.med66.com

149. 【正确答案】D

【答案解析】流脑实验室检查首选脑脊液涂片镜检。

150. 【正确答案】A

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

【答案解析】阿米巴痢疾实验室检查首选大便涂片镜检。

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com