

【牙体牙髓病学】

患残髓炎的患牙,若使用强温度刺激,则可产生

- A. 牙本质敏感
- B. 一过性疼痛
- C. 迟缓性反应痛
- D. 无反应
- E. 剧烈疼痛

【正确答案】C

【答案解析】强温度刺激残髓炎患牙可引起患牙迟缓性痛,叩痛(+)或(±)。

【牙体牙髓病学】

关于逆行性牙髓炎的治疗措施叙述错误的是

- A. 患牙如能保留,先去髓,再根管治疗
- B. 牙髓治疗的同时进行牙周系统治疗
- C. 必要时考虑将患根截除,保留患牙
- D. 如治疗预后差,则可直接拔除患牙止疼
- E. 不必考虑牙周手术,如分根术、截根术等

【正确答案】E

【答案解析】逆行性牙髓炎治疗原则:根据患牙牙周病变的程度和牙周治疗的预后来决定是否保留患牙。患牙如能保留,先摘除全部牙髓,消除急性症状,再行根管治疗。同时进行牙周系统治疗。必要时考虑将患根截除,保留患牙。如牙周病变严重,治疗预后差,则可直接拔除患牙止疼。

【儿童口腔医学】

乳牙列牙齿外伤更容易造成

- A. 牙根折断
- B. 牙冠折断
- C. 牙根和牙冠联合折断
- D. 牙齿移位
- E. 牙根吸收

【正确答案】D

【答案解析】乳牙列期牙槽骨骨质较疏松,乳牙外伤造成牙根或者牙冠的折断的较少,更容易造成牙齿移位或脱出。

【儿童口腔医学】

年轻恒牙全脱出多发生于

A. 上颌中切牙

B. 上颌侧切牙

C. 上颌尖牙

D. 下颌中切牙

E. 下颌侧切牙

【正确答案】A

【答案解析】年轻恒牙全脱出：常见于单个年轻恒牙，上颌中切牙多发。牙齿全脱位时应该立即进行再植术。

