

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2020 年第 26 期

【诊断学基础】

莫氏试验是

- A. 酚红排泌试验
- B. 血清尿素氮、血清肌酐测定
- C. 内生肌酐清除率测定
- D. 浓缩稀释试验
- E. 对氨马尿酸盐清除率试验

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

莫氏试验可了解肾脏的稀释--浓缩功能，是反映远端肾小管和集合管功能状态的敏感试验。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【中药学】

被誉为“诸药之舟楫”，能载药上行的药物是

- A. 桔梗
- B. 柴胡
- C. 升麻
- D. 白前
- E. 葛根

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

桔梗在中药方剂中作为引经药使用由来已久。桔梗能载药上行，常作为治疗人体上部疾病的引经药，故前人称之为“舟楫之剂”。正如《本草求真》所云：“桔梗系开提肺气之药，可为诸药舟楫，载之上浮。”【医学教育网原创】故本题答案选 A。

【中医儿科学】

风疹的好发年龄哪种说法正确

- A. 1 岁左右
- B. 1~5 岁
- C. 1~8 岁

D. 1~12 岁

E. 任何年龄

学员提问：为什么选 B?

答案及解析：本题答案为 B。

风疹即风疹，是感受风疹时邪，以轻度发热，咳嗽，全身皮肤出现细沙样玫瑰色斑丘疹，耳后及枕部淋巴结（淋巴结）肿大为特征的一种急性出疹性传染病。一年四季均可发生，冬春季节好发，且可造成流行。1~5 岁多见。患病后可获得持久性免疫。风疹疾病多轻，很少有并发症的发生，但是，孕妇在妊娠早期若患本病，常可影响胚胎的正常发育，引起流产，或导致先天性心脏病、白内障、脑发育障碍等疾病。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

【中医妇科学】

素有滑胎病史的病人，孕后保胎治疗的时间一般需超过既往流产月份的

A. 1 周

B. 2 周以上

C. 1 月

D. 2 月

E. 3 月

学员提问：为什么选 B?

答案及解析：本题答案为 B。

素有滑胎病史的病人，孕前宜以补肾健脾，益气养血，调理冲任为主；孕后即应积极进行保胎治疗，并应维持超过既往堕胎、小产时间 2 周以上，万不可等到发生流产先兆以后再进行诊治。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

【中医基础理论】

偏食辛温燥热，则可导致

A. 肝经湿热

B. 心肝火旺

C. 肠胃积热

D. 肺胃热盛

E. 肺胃津伤

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

过于偏嗜寒热饮食，可导致人体阴阳失调而发生某些病变，偏嗜辛温燥热饮食日久，则易致肠胃积热等。饮食入胃，经过胃的腐熟下传肠道，所以对胃肠的功能影响最明显。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

