

医学教育网护士执业资格考试：《答疑周刊》2020 年第 40 期

1. 【问题】不同分子大小的右旋糖酐分别有什么作用？

【解答】右旋糖酐：常用的溶液分两种：

①中分子右旋糖酐：可提高血浆胶体渗透压，扩充血容量；

②低分子右旋糖酐：可降低血液黏稠度，改善微循环。

2. 【问题】如何区别心绞痛与心肌梗死？

【解答】

心绞痛与心肌梗死的鉴别

区别点	心绞痛	心肌梗死
诱发因素	体力劳动、情绪激动、饱餐、寒冷、吸烟、心动过速等	常无明显诱因
疼痛性质	压迫感、发闷、紧缩感，偶可有濒死感	与心绞痛类似
持续时间	3~5 分钟，一般不超过 15 分钟	数小时或数天
缓解方式	含服硝酸甘油缓解	含服硝酸甘油不缓解

3. 【问题】各种胃药服用时间？

【解答】抗酸药应在餐后 1 小时及睡前服用，避免与牛奶同时服用；抗胆碱能药及胃动力药如吗丁林、西沙必利等应在餐前 1 小时及睡前 1 小时服用。硫糖铝在餐前 1 小时与睡前服用效果最好，如需同时使用抑制药，抑酸药应在硫糖铝服前半小时或服后 1 小时给予。

4. 【问题】病室湿度过高或过低对病人有什么影响？

【解答】①湿度过高时，潮湿的空气利于细菌的繁殖，可增加医院内感染的发生率；同时，机体蒸发作用减弱，出汗受到抑制，病人感觉闷热，尿液排出增多，加重了肾脏的负担。

②湿度过低时，空气干燥，水分大量蒸发，可致口干舌燥、咽痛、烦渴等，对气管切开、呼吸道感染、急性喉炎的病人尤为不利。

5. 【问题】乙醇擦浴时，当体温降至多少，应取下头部冰袋？

【解答】乙醇擦浴时，当体温降至 39℃时，应取下头部冰袋。