

【中医外科学】

关于乳癖肿块的特点, 不正确的是

- A. 可单侧发生
- B. 质地中等
- C. 多伴有压痛
- D. 与皮肤粘连
- E. 活动度好

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

乳房肿块可发生于单侧或双侧, 大多位于乳房的外上象限, 也可见于其他象限。肿块的质地中等或质硬不坚, 表面光滑或颗粒状, 活动度好, 大多伴有压痛。肿块的大小不一, 一般在 1~2cm 左右, 大者可超过 3 cm。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【中医诊断学】

身倦乏力, 少气, 自汗, 腹痛拒按, 舌有紫斑, 证属

- A. 气滞血瘀
- B. 气滞
- C. 血瘀
- D. 气虚血瘀
- E. 血瘀兼血虚

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。

气虚血瘀证的辨证要点: 临床以面色淡白无华或面色紫暗, 倦怠乏力, 少气懒言, 局部疼痛如刺, 痛处固定不移、拒按, 舌淡紫, 或有斑点, 脉涩等为辨证依据。故此题的最佳选项是 D。【医学教育网原创】故本题答案选 D。

【传染病学】

感染 HBV 后最早出现的血清学标志是

- A. HBsAg
- B. HBeAg
- C. 抗-HBs

D. 抗-HBe

E. 抗-HBc

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

HBsAg: 是感染 HBV 后最早出现的血清学标志, 感染后 2 周血清中开始出现, 而后出现 ALT 升高及症状、体征等。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

【方剂学】

以降逆化痰, 益气和胃为主要功用的方剂是

A. 旋覆代赭汤

B. 半夏厚朴汤

C. 半夏泻心汤

D. 橘皮竹茹汤

E. 丁香柿蒂汤

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

旋覆代赭汤擅长降逆化痰、益气和胃, 主治胃虚痰阻气逆证。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

【内科学】

诊断溃疡性结肠炎最重要的手段是

A. X 线钡剂造影

B. 结肠镜检查

C. 血沉检查

D. 免疫指标检查

E. 粪便检查

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

结肠镜检查, 是溃疡性结肠炎诊断与鉴别诊断的最重要手段。【医学教育网原创】故本题答案选 B。