

医学教育网初级护师:《答疑周刊》2020年第49期

1. 【问题】各种阴道炎的特征表现及治疗?

【解答】

	滴虫性阴道炎	外阴阴道假丝酵母菌病(VVC)	细菌性阴道病	萎缩性阴道炎
病原体	阴道毛滴虫	白假丝酵母菌	加德纳细菌、厌氧菌	--
诱因	阴道环境 PH 上升	PH ↓、妊娠、糖尿病, 广谱抗菌素	菌群失调	PH ↑
传播方式	性交(性传播疾病)	内源性传染	浴池、厕所、衣服、器械等	--
症状	脓性泡沫状白带、外阴瘙痒	白带多且呈豆渣样、剧烈的外阴瘙痒	臭味或鱼腥味、轻度瘙痒	稀薄淡黄色或血性白带
体征	阴道充血、点状出血、泡沫状物	阴道充血糜烂、阴道黏膜上附着白色膜样物	阴道黏膜正常	阴道黏膜充血; 常有小出血点
化验	悬滴法查见滴虫	悬滴法找芽孢及假丝酵母菌	清洁度改变, 线索细胞+	大量白细胞及基底层细胞, 无滴虫及念珠菌
治疗	甲硝唑	抗真菌药、碱性药	抗菌素、改善环境	1%乳酸或0.1%~0.5%醋酸液, 甲硝唑
是否夫妻同治	是	对有症状的性伴侣应同时进行治疗, 无症状者无需治疗	否	否

2. 【问题】绒毛膜癌转移灶症状

【解答】阴道转移——破溃出血可发生阴道大出血;

肺转移——咯血、胸痛及憋气等；

脑转移——头痛、喷射性呕吐、抽搐、偏瘫以及昏迷等；

肝和脾转移——呕血及柏油样大便；

肾转移——血尿。

3. 【问题】葡萄胎、侵蚀性葡萄胎、绒癌如何鉴别？

【解答】

	葡萄胎	侵蚀性葡萄胎	绒毛膜癌
先行妊娠	无	葡萄胎	各种妊娠
潜伏期	无	6 个月以内	12 个月以上
绒毛	有	有	无
浸润深度	蜕膜层	肌层	肌层、肺
治疗	清宫	化疗	化疗
随访	2 年	5 年	5 年

4. 【问题】子宫脱垂分级？

【解答】I 度：子宫颈下垂距处女膜 < 4cm，但未脱出阴道口外。

轻型：子宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，未达处女膜缘。

重型：子宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈。

II 度：子宫颈及部分子宫体已脱出阴道口外。

轻型：子宫颈脱出阴道口，子宫体仍在阴道内。

重型：部分子宫体脱出阴道口。

III 度：子宫颈及子宫体全部脱出阴道口外。