

1. 外科疾病的发生, 最常见的是

- A. 风、湿
- B. 热、火
- C. 寒、湿
- D. 暑、火
- E. 风、热

2. 风邪的致病特点

- A. 痛无定处, 走注甚速
- B. 痛有定处, 得暖则减
- C. 多夹湿, 热甚则痛
- D. 易侵下位, 重浊黏腻
- E. 发病迅速, 来势凶猛

3. 下列各项中不属外来伤害致病的是

- A. 跌仆损伤
- B. 沸水烫伤
- C. 食物不节
- D. 火焰伤
- E. 金刃创伤

4. 下列各项中不属病因特殊之毒的是

- A. 虫毒
- B. 蛇毒
- C. 冻伤
- D. 疯犬毒
- E. 疫毒

5. 下列表现中属于阴证的是

- A. 皮肤红活嫩赤
- B. 肿胀范围局限
- C. 皮色紫暗
- D. 肿势高突
- E. 根盘收束

6. 发于下部的疾病常见的病因是

- A. 痰湿
- B. 湿热
- C. 火郁
- D. 风湿
- E. 风温

7. 疮疡化脓时, 临床常见的疼痛性质是

- A. 阵发痛

- B. 持续痛
- C. 烧灼痛
- D. 胀裂痛
- E. 鸡啄痛

8. 寒痛的特点是

- A. 游走性，痛无定处
- B. 阵发性，攻痛无常
- C. 木痛，得热缓解
- D. 酸痛，得热缓解
- E. 持续性固定性胀痛

9. 痒的常见病因是

- A. 风胜、湿胜、热胜、虫淫、血虚
- B. 风胜、热胜、湿胜、阴虚、血虚
- C. 风胜、湿胜、热胜、燥胜、阴虚
- D. 风胜、热胜、湿胜、虫淫、阴虚
- E. 风胜、湿胜、热胜、血虚、火胜

10. 下列关于辨脓的方法，错误的是

- A. 接触法
- B. 透光法
- C. 切开法
- D. 穿刺法
- E. 点压法

11. 痰肿的临床特点是

- A. 肿势高突，根盘收束
- B. 坚硬如石，皮色不变
- C. 肿势软如棉，或硬如馒
- D. 皮紧内软，喜怒有变
- E. 皮肤漫肿，其色青紫

12. 肿疡毒势方盛，正气已虚，不能托毒外出者，内治方药宜选用

- A. 透脓散
- B. 仙方活命饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 托里消毒散
- E. 清肝解郁汤

13. 手指关节处脓肿的切口选择应

- A. 越过关节切开
- B. 放射状切开
- C. 自然纹理切开

- D. 避免越过关节  
E. 以脓肿为中心，放射状切开

14. 疮疡的半阴半阳证，外用药物宜选用

- A. 冲和膏  
B. 太乙膏  
C. 阳和解凝膏  
D. 咬头膏  
E. 以上都不是

15. 阳证疮疡外用药物宜首选

- A. 红油膏  
B. 冲和膏  
C. 金黄膏  
D. 疯油膏  
E. 以上都不是

16. 阴证疮疡外敷药物宜首选

- A. 冲和膏  
B. 阳和解凝膏  
C. 太乙膏  
D. 疯油膏  
E. 以上都不是

17. 挂线法常用于治疗

- A. 内痔  
B. 脱肛  
C. 瘰疬  
D. 肛漏  
E. 以上都不是

18. 对升丹过敏者，提脓祛腐时宜选用的外用药是

- A. 红灵丹  
B. 八宝丹  
C. 平胬丹  
D. 黑虎丹  
E. 九一丹

19. A. 补法

- B. 清法  
C. 消法  
D. 托法  
E. 透法

(1) 一切肿疡初起的治法总则为

(2) 适用于外疡成脓期的的治疗法则为

20. 丹毒发病的总因为

- A. 肝脾郁火
- B. 湿热火毒
- C. 胎热火毒
- D. 风热火毒
- E. 血热火毒

21. 结喉之处肿势散漫，坚硬灼痛，壮热口渴，吞咽困难的疾病是

- A. 颈痈
- B. 瘰疬
- C. 发颐
- D. 髻核
- E. 锁喉痈

22. 流注好发部位是

- A. 头面部
- B. 骨关节
- C. 四肢躯干的肌肉深部
- D. 项后部
- E. 手足部

23. 有头疽患者若伴有消渴病，最易出现的变证是

- A. 走黄
- B. 内陷
- C. 失荣
- D. 肺痈
- E. 颈痈

24. 有头疽的好发部位是

- A. 臀部
- B. 面部
- C. 四肢部
- D. 项后背部
- E. 以上都不是

25. 有头疽初起的局部症状是

- A. 粟粒样脓头
- B. 肿硬如钉丁
- C. 漫肿而无头
- D. 腐烂如莲蓬
- E. 腐烂大于尺

26. 三陷证中之火焰型多发生于疽证第几候

- A. 2 候
- B. 1~2 候
- C. 3~4 候
- D. 2~3 候
- E. 4 候

27. 发生“走黄”的原因是

- A. 正虚
- B. 伤津
- C. 腑实
- D. 邪盛
- E. 表实

28. 三陷证中之虚陷型多发生于疽证第几候

- A. 2 候
- B. 1~2 候
- C. 2~3 候
- D. 4 候
- E. 3~4 候

29. 颈痈风热痰毒证治疗选用

- A. 五味消毒饮
- B. 黄连解毒汤
- C. 仙方活命饮
- D. 牛蒡解肌汤
- E. 普济消毒饮

30. 发于体表**皮肉**之间的急性化脓性疾患是

- A. 疔
- B. 有头疽
- C. 疗
- D. 附骨疽
- E. 痈

**疮疡总结：**

	性质	发病部位	范围	特点	分类
疔	急性化脓性 性疾病	<b>肌肤浅表 部位</b>	3cm	突起 <b>根浅</b> ，色红，灼热，疼痛， <b>易脓，易溃，易敛</b>	暑疔（有头疔，无头疔）， 蝼蛄疔，疔病
疗	急性化脓性 性疾病		3~6cm	疮形小，但 <b>根脚坚硬，状如钉工</b>	颜面疔，手足疔，红丝疔

痈	急性化脓性 疾病	体表皮肉 之间	6~9cm	光软无头，红肿疼痛， 易肿，易脓，易溃，易敛	痈，颈痈
发	急性化脓性 疾病		范围比痈 更大	初期无头，红肿蔓延成 片，边界不清，灼热疼痛	锁喉痈，臀痈，手发背， 足发背
丹毒	急性感染 性 疾病			皮肤突然发红成片，色如 涂丹	内发丹毒，抱头火丹， 流火，赤游丹毒
有头 疽	急性化脓 性 疾病	肌肤间，向 深部扩散	9-12cm	粟粒样脓头，红肿热痛， 溃后状如莲蓬蜂窝	
流注	急性化脓 性 疾病	肌肉深部		局部漫肿疼痛， 皮色如常，容易走窜	

31. 颈痈的病因病机是

- A. 风温、风热夹痰蕴结少阳、阳明之络
- B. 风温毒邪客于肺胃，积热上蕴，夹痰凝结
- C. 心脾湿热，火毒流于小肠，结于脐中，以致血凝毒滞而成
- D. 湿热火毒蕴结，营气不从，逆于肉里
- E. 湿热下注，壅遏不行，阻于脉络

32. 蜈蚣疔的临床特点不包括

- A. 根脚坚硬
- B. 疮大如梅李
- C. 疔中心有脓头
- D. 日久头皮穿空
- E. 多发于儿童头部

33. 局部红肿热痛，突起根浅，肿势局限，范围在 3cm 左右，易脓、易溃、易敛之病是

- A. 痈
- B. 疔
- C. 疖
- D. 有头疽
- E. 无头疽

暑疖	有头 疖	患处皮肤上有一红色结块，范围约 3cm，灼热疼痛，突起根浅，中心有一 脓头，出脓即愈
	无头 疖	患处皮肤上有一红色结块，范围约 3cm 左右，无脓头，表面灼热，触之疼 痛，2~3 天化脓，溃后多迅速愈合
蜈蚣 疔	多发于儿童头部。如蜈蚣串穴之状。治疗宜十字形切开。病久可损及颅骨	
疔病	好发于项后背臀部。几个到几十个，反复发作，缠绵不愈。患消渴病、习惯性便秘 或营养不良者易患本病。	



34. 生于下列哪一部位的疔疮最易发生走黄

- A. 项后
- B. 四肢
- C. 颜面
- D. 少腹
- E. 臄中

35. 托盘疔发生于

- A. 指端
- B. 指甲下
- C. 指甲背
- D. 手指关节
- E. 手掌中心

	临床表现（发作部位）	治疗方法
蛇眼疔	多局限于 <b>指甲一侧边缘的近端处</b>	宜沿甲旁 0.2cm 挑开引 <b>流</b>
蛇头疔	<b>指端</b> 感觉麻痒而痛	宜在 <b>指掌面一侧作纵形切口</b> ，不可指掌面正中切开
蛇肚疔	发于 <b>指腹部</b> ，整个患指红肿疼痛，呈圆柱状， <b>形似小红萝卜</b>	宜在 <b>手指侧面作纵形切口</b> ，切口长度不得超过上下指关节面
托盘疔	初起整个手掌肿胀高突， <b>失去正常的掌心凹陷</b>	<b>依掌横纹切开</b> ，切口应够大，保持引流通畅
足底疔	初起 <b>足底部疼痛</b> ，不能着地，按之坚硬。	

36. 辨别蛇头疔成脓与否，用什么方法最为可行

- A. 痛剧而呈搏动性者
- B. 应指验脓法
- C. 穿刺验脓法
- D. 痛甚脉数者
- E. 透光验脓法

37. 红丝疔挑刺疗法的操作要点为

- A. 沿红线两头针刺出血
- B. 梅花针沿红线打刺，微微出血
- C. 用三棱针从中挑断红线，微微出血
- D. 按“B”选项方法，并加神灯照法
- E. 用三棱针沿红线寸寸挑断，并令微微出血

38. 8月上旬，一男性儿童前额部出现 2 个红肿结块，约 2cm×2cm，中央有一个脓头未溃，疼痛拒按，伴口渴便秘，尿短赤。应选用

- A. 五味消毒饮

- B. 仙方活命饮  
C. 清暑汤  
D. 防风通圣散  
E. 黄连解毒汤

邪盛正不虚	热毒蕴结证: 常见于 <b>气实火盛</b> 者。 治法: 清热解毒。 用方: 五味消毒饮, 或黄连解毒汤加减
	<b>暑热浸淫</b> 证: 发于 <b>夏秋季节</b> 治法: 清暑化湿解毒。 用方: 清暑汤
正虚邪盛	体虚毒恋, 阴虚内热证: 治法: 养阴清热解毒。 用方: 仙方活命饮合增液汤
	体虚毒恋, 脾胃虚弱证: 治法: 健脾和胃, 清化湿热。 用方: 五神汤合参苓白朮散

39. 患者鼻翼右侧有一枚粟粒样脓头, 麻痒并作, 红肿热痛, 顶突根深坚硬, 舌红, 苔薄黄, 脉数。治则应为

- A. 和营托毒  
B. 清热利湿, 和营消肿  
C. 散风清热, 化痰消肿  
D. 清热解毒  
E. 和营托毒, 清热利湿

40. A. 五味消毒饮  
B. 柴胡清肝汤  
C. 普济消毒饮  
D. 犀角地黄汤  
E. 五神汤合萆薢渗湿汤

- (1) 丹毒风热毒蕴证选用的方剂是  
(2) 丹毒湿热毒蕴证选用的方剂是

风热毒蕴证 (抱头火丹)	肝脾湿火证 (内发丹毒)	湿热毒蕴证 (流火)	胎火蕴毒证 (赤游丹毒)
发于 <b>头面部</b> , 皮肤焮红灼热, 肿胀疼痛, 伴恶寒发热, 头痛	发于 <b>胸腹腰胯</b> 部, 皮肤红肿, 摸之灼手	发于 <b>下肢</b> , 局部红肿灼热疼痛	发于 <b>新生儿</b> , <b>多见臀部</b> 。红肿灼热, 多呈游走性
<b>普济</b> 消毒饮	<b>柴胡清肝</b> 汤, 龙胆泻肝汤	<b>五神汤</b> 合 <b>萆薢</b> 渗湿汤	<b>犀角地黄汤</b> 合 <b>黄连解毒</b> 汤

41. A. 内发丹毒  
B. 赤游风  
C. 流火  
D. 抱头火丹  
E. 类丹毒



- (1) 患者**躯干部**皮肤突然发红成片，色如丹涂的急性感染性疾病称  
(2) 患者**头面部**皮肤突然发红成片、色如涂丹的急性感染性疾病称

内发丹毒	发生在躯干部位的
抱头火丹	发生在头面部的
流火	发生在小腿足部的
赤游丹毒	发生在新生儿臀部的

42. 粉刺性乳痈的西医病名是

- A. 急性乳腺炎
- B. 化脓性乳腺炎
- C. 浆细胞性乳腺炎
- D. 结核性乳腺炎
- E. 淋巴细胞性乳腺炎

43. 乳核肿块的直径多在

- A. 0.5~3cm 之间
- B. 0.5~4cm 之间
- C. 0.5~5cm 之间
- D. 0.5~6cm 之间
- E. 0.5~7cm 之间

44. 对单发的乳核宜采用何种治疗方法

- A. 手术切除
- B. 中药治疗
- C. 放射治疗
- D. 抗癆治疗
- E. 以上都不是

45. 下列哪项**不是**乳岩肿块的特点

- A. 无痛无热
- B. 皮色不变
- C. 表面光滑
- D. 质地坚硬
- E. 推之不移

46. 乳岩的好发年龄是

- A. 30~50 岁
- B. 30~60 岁
- C. 40~50 岁
- D. 40~60 岁
- E. 50~60 岁

	乳痈	粉刺性乳痈	乳癖	乳核	乳岩
年龄	产后 3~4 周		25~45 岁	20~25 岁	40~60 岁
特点	乳房部的痈	常有 <b>乳头凹陷</b> ，初起多位于乳晕，化脓后脓中夹 <b>脂质样</b> 物质	大小不等，质地不硬，活动度好， <b>边界不清</b>	单个或多个，0.5~5cm，形如丸卵， <b>质地坚实</b> ，边界清楚，表面光滑	边界不清，质地坚硬，表面不光滑，不易移动
西名		浆细胞性乳腺炎	乳腺增生	乳腺纤维腺瘤	乳腺癌
			与月经周期或情绪密切相关	与月经无关 单发的手术切除	关键在早期诊断 手术治疗为主

47. 患者女性，42 岁，乳房肿块，界限不清，经前乳房胀痛，应首先考虑

- A. 乳岩
- B. 乳核
- C. 乳癖
- D. 乳痈
- E. 乳疔

48. 患者女性，26 岁，产后第三周出现恶寒发热，右乳肿胀疼痛，体温 37℃，检查见右乳红肿，无波动感，口渴，舌红，苔薄黄，脉数。此时的治疗方法是

- A. 切开引流
- B. 疏肝理气，化痰散结
- C. 疏肝清胃，通乳消肿
- D. 清热解毒，托里透脓
- E. 泻火解毒利湿

49. A. 逍遥萎贝散

- B. 柴胡疏肝散
- C. 瓜蒌牛蒡汤
- D. 托里消毒散
- E. 桃红四物汤

(1) 治疗乳痈气滞热壅证首选

(2) 治疗乳痈正虚毒恋证首选

乳痈的辨证论治：（**脱衣偷瓜**）初起，成脓，溃后三个阶段

气滞热壅证	热毒炽盛证	正虚毒恋证
<b>皮色不变或微红</b> ，	肿块 <b>变软有应指感</b> ， <b>壮热</b> 。	<b>溃脓后，脓汁清稀</b> ， <b>愈合缓慢</b>

肿痛。		
疏肝清胃，通乳消肿	清热解毒，托里透脓	益气 and 营托毒
瓜蒌牛蒡汤	透脓散	托里消毒散

50. 患者，女，45 岁，甲状腺肿大 20 年，呈漫肿，无痛，随喜怒而消长，属中医

- A. 石瘰
- B. 肉瘰
- C. 瘰疬
- D. 气瘰
- E. 失荣

气瘰	肉瘰	石瘰	瘰疬
多发于 <b>青春期</b> ，流行地区常见于入学年龄的儿童		多发于 <b>40 岁以上</b> 的患者	
<b>随喜怒而消长</b> ，随吞咽动作上下移动	随吞咽动作上下移动，如肉之团	坚硬如石，凹凸不平，推之不移	结喉两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓
	甲状腺腺瘤或囊肿	甲状腺癌	急性或亚急性甲状腺炎

51. 患者，颈部肿块柔韧，随吞咽动作上下移动，急躁易怒，汗出心悸，失眠多梦，消谷善饥，形体消瘦，手部震颤。其辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 气滞痰凝证
- C. 气阴两虚证
- D. 肝肾不足证
- E. 冲任失调证

内治法		外治法
气滞痰凝证	气阴两虚证	阳和解凝膏 掺黑退消或 桂麝散外敷
颈部一侧或两侧肿块，呈圆形，不红不热，随吞咽而上下移动，一般无全身症状	颈部肿块柔韧，随吞咽而上下移动，常伴急躁易怒，心悸，失眠多梦， <b>消谷善饥</b> ，形体消瘦，月经不调，手部震颤	
苔薄腻，脉弦滑	舌红，苔薄，脉弦	
理气解郁，化痰软坚	益气养阴，软坚散结	
<b>逍遥散</b> 合海藻 <b>玉壶汤</b>	<b>生脉散</b> 合海藻 <b>玉壶汤</b>	

52. 瘰疬患者，肿块坚实，轻度作胀，重按才感疼痛，其痛牵引耳后枕部，有喉间梗塞感，痰多，苔黄腻，脉弦滑。其辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 气滞痰凝证

- C. 血瘀化热证
- D. 痰瘀内结证
- E. 冲任失调证

瘰疬的内治法:

风热痰凝证	气滞痰凝证
局部结块疼痛明显, 伴恶寒发热, 头痛, 口渴咽干, 苔薄黄, 脉浮数或滑数	肿块坚实, 轻度作胀, 重按方痛, 痛引耳后枕部, 或喉间梗塞感, 痰多, 苔黄腻, 脉弦滑
疏风清热化痰	疏肝理气, 化痰散结
牛蒡解肌汤	柴胡疏肝汤

53. 患者, 女, 35 岁。结喉正中偏左有一半圆形包块, 边界清楚, 表面光滑, 皮色如常, 能随吞咽上下移动。苔薄腻, 脉弦滑。

(1) 其诊断是

- A. 气瘰
- B. 肉瘰
- C. 筋瘰
- D. 瘰疬
- E. 石瘰

(2) 其治法是

- A. 理气解郁, 化痰软坚
- B. 化痰软坚, 疏肝行郁
- C. 疏风清热, 化痰解郁
- D. 疏肝清热, 化痰消肿
- E. 疏肝理气, 解郁消肿

(3) 治疗应首选的方剂是

- A. 丹栀逍遥散
- B. 四海舒郁丸
- C. 海藻玉壶汤
- D. 牛蒡解肌汤
- E. 柴胡清肝饮

54. 石瘰相当于西医学的

- A. 甲状腺炎
- B. 甲状腺癌
- C. 甲状腺肿
- D. 甲状腺病
- E. 甲状腺瘤

55. 肉瘤的西医病名是

- A. 脂肪肉瘤
- B. 骨骼肌肉瘤
- C. 脂肪瘤
- D. 纤维肉瘤

E. 平滑肌肉瘤

56. 毛细血管瘤的显著特点是

- A. 边界不清
- B. 瘤体巨大
- C. 质地坚硬
- D. 压缩性大
- E. 皮色鲜红

57. 海绵状血管瘤的显著特点是

- A. 皮色鲜红
- B. 压缩性大
- C. 青筋累累
- D. 边界不清
- E. 质地坚硬

58. 下列哪项不是失荣的特点

- A. 质地坚硬
- B. 表面凹凸不平
- C. 多发于青少年
- D. 肿块联结成串
- E. 预后不良

59. 阳和汤用于治疗失荣的证型为

- A. 瘀毒化热证
- B. 阴毒结聚证
- C. 痰瘀互结证
- D. 气郁痰结证
- E. 心肾火毒证

气郁痰结证	阴毒结聚证	瘀毒化热证	气血两亏证
舌红，苔微黄腻， <b>脉弦滑</b>	舌淡， <b>苔白腻</b> ，脉沉细 或弦细	舌 <b>红</b> ，苔 <b>黄</b> ，脉 <b>数</b>	舌淡，苔白或无苔， 脉沉细
理气解郁，化痰散 结	温阳散寒，化痰散结	清热解毒，化痰散 瘀	补益气血，解毒化瘀
<b>化痰开郁方</b> （经验 方）	<b>阳和汤</b>	<b>五味消毒饮</b> 合 <b>化坚 二陈丸</b>	<b>八珍汤</b> 合 <b>四妙勇安汤</b>

60. 患者，女性，40 岁。**无意中发现**背部肿块，无自觉症状，查：局部皮色不变，肿块触之柔软，呈分叶状，推之可移动，无压痛。该患者最可能的诊断是

- A. 疔
- B. 背疽
- C. 血瘤

- D. 脂瘤
- E. 肉瘤

61. 患者左前臂部有一肿块，呈扁平隆起，质地柔软，状如海绵，皮色略紫，按之肿块可缩小，据此可诊断为

- A. 气瘤
- B. 脂瘤
- C. 筋瘤
- D. 血瘤
- E. 肉瘤

62. A. 气瘤

- B. 血瘤
- C. 筋瘤
- D. 肉瘤
- E. 骨瘤

- (1) 由体表血络扩张丛集形成的肿瘤是
- (2) 发于皮里膜外，由脂肪组织过度增生形成的肿瘤是

63. A. 气瘤

- B. 血瘤
- C. 筋瘤
- D. 肉瘤
- E. 骨瘤

- (1) 自血脉肿起，赤缕红丝，颜色红紫，属于
- (2) 发于皮里膜外，柔软如棉，其形如馒，属于

64. A. 曲张静脉团

- B. 毛细血管瘤
- C. 蔓状血管瘤
- D. 冠状动脉瘤
- E. 海绵状血管瘤

- (1) 皮肤上有红色丘疹，逐渐长大，界限清楚，大小不等，质软可压缩，压之可褪色属于
- (2) 肿物质地柔软似海绵，常呈局限性半球形、扁平或高出皮面的隆起物，有很大压缩性属于

65. A. 心肾火毒证

- B. 肝经火旺证
- C. 脾统失司证
- D. 心火妄动证
- E. 肝郁化火证

- (1) 血瘤肿块大小不一，色泽鲜红，边界不清，不痛不痒，伴五心烦热，面赤口渴，口舌生疮，属于
- (2) 血瘤瘤体体积不大，边界不清，表面色红，质地柔软易出血，无疼痛，伴肢软乏力，面色萎黄者属于



血瘤的辨证论治：

心肾火毒证	肝经火旺证	脾统失司证
多见于 <b>初生婴儿</b> ，肿块色泽鲜红，口渴面赤，尿黄便干， <b>口舌生疮，舌红苔薄黄脉细数</b>	多发于头面或大腿，常因 <b>情志不遂</b> 而生胀痛，伴心烦 <b>易怒</b> ，舌红苔微黄， <b>脉弦细数</b>	好发于下肢， <b>质软</b> 易出血，不痛， <b>伴肢软乏力，面色萎黄，纳食不佳</b> ，舌淡苔白脉细
清心泻火，凉血解毒	清肝泻火，祛瘀解毒	健脾益气，化湿解毒
<b>芩连二母丸合凉血地黄汤</b>	<b>丹栀逍遥散合清肝芦荟丸</b>	<b>顺气归脾丸</b>

66. 下列关于黄水疮的说法不正确的是

- A. 以清暑利湿为主要治法
- B. 有接触传染和自体接种的特性
- C. 在托儿所、幼儿园或家庭中传播流行
- D. 皮损为浅在性脓疱和脓痂
- E. 没有传染性的化脓性皮肤病

67. 以下哪一项为淋病临床特点

- A. 龟头红肿，包皮内有多量脓性分泌物
- B. 外生殖器有多个痛性溃疡，表面有脓性分泌物，尿道口红肿
- C. 尿道分泌物少，为黏液状
- D. 尿道口刺痛，尿道口排出脓性分泌物
- E. 外生殖器多为单个无痛性溃疡

68. 牛皮癣的皮损特点为

- A. 瘙痒性风团，发无定处，骤起骤退，消退后不留任何痕迹
- B. 对称分布，多形损害，剧烈瘙痒
- C. 皮损呈圆形或多角形的扁平丘疹融合成片，极易形成苔藓样变
- D. 皮损为暗红、淡紫色或皮肤色多角形扁平丘疹，有蜡样光泽、网状纹
- E. 皮损为基底淡红色，上覆银白色鳞屑，剥后有薄膜现象和点状出血

69. 以下哪项不是白癣的特点

- A. 多见于学龄儿童
- B. 毛发干枯无光泽
- C. 可形成永久性脱发
- D. 易在距头皮 0.3~0.8cm 处折断
- E. 病发根部有白色菌鞘包绕

**头癣：拔发疗法**

	头癣	
白秃疮		肥疮

西医	白癣	黄癣
好发人群	学龄儿童	儿童好发
临床表现	头皮有覆盖灰白鳞屑的斑片。 头发常在距头 0.3~0.8cm 处折断。青春期可自愈	蜡黄色癣痂堆积 鼠尿臭味。 永久性脱发

70. 以下哪项不是肥疮的特点

- A. 好发于儿童
- B. 皮损处有黄癣痂堆积
- C. 头发干燥，穿过皮损，易折断
- D. 皮损处可闻及鼠尿臭
- E. 皮损处头发不会形成永久性脱发

71. 对于花斑癣，以下哪项说法不正确

- A. 常发于多汗体质青年
- B. 皮损好发于颈项、躯干
- C. 不会融合成片
- D. 好发于多汗部位
- E. 皮损为界清的圆形或不规则的无炎症性斑块

72. 寻常疣湿热血瘀证的首选方是

- A. 黄连解毒汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 马齿苋合剂
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 五味消毒饮

73. 头发突然发生斑块状脱落的慢性皮肤病，称为

- A. 头癣
- B. 鳞状痂
- C. 肥疮
- D. 白秃疮
- E. 油风

74. 药毒是药物进入人体内所致的急性炎症反应，与其他疾病相比，其特点是

- A. 发病前有用药史，有一定的潜伏期，皮损多形性
- B. 发病前均有明显的接触某种物质病史
- C. 皮损呈丘疹样风团，上有针尖大小的瘀点、丘疹或水疱，呈散在性分布
- D. 皮损表现为浅在性脓疱和脓痂，有接触传染和自体接种的特性
- E. 对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，倾向湿润，反复发作，易转为慢性

75. 湿疹的发生与下列哪些经脉的病变密切相关

- A. 心、肝、脾
- B. 心、脾、肾
- C. 心、肺、肝
- D. 心、肺、肝、脾
- E. 心、肝、脾、肾

76. 中医认为梅毒的病因病机为

- A. 淫秽疫毒与湿热、风邪杂合所致
- B. 湿热秽浊之邪侵及肝经、下注阴部
- C. 湿热秽浊由下焦前阴入侵，阻于膀胱及肝经
- D. 秽浊之毒酿生湿热，下注皮肤黏膜
- E. 下焦湿热导致膀胱功能失调，三焦水道通调不利

77. 疥疮的皮损特点是

- A. 皮肤呈丘疹样风团，上有针头大的瘀点、丘疹或水疱
- B. 夜间剧痒，在皮损处有灰白色或普通皮色的隧道
- C. 皮肤上浅在性脓疱和脓痂，有传染性和自体接种的特性
- D. 躯干部位皮肤瘙痒及血痂
- E. 对称分布，多形损害，剧烈瘙痒

78. 下列哪一项为尖锐湿疣的中医病因病机

- A. 湿热秽浊由下焦前阴入侵，阻于膀胱及肝经
- B. 湿热秽浊之邪侵及肝经、下注阴部
- C. 风热毒邪搏于肌肤而生
- D. 秽浊之毒酿生湿热，下注皮肤黏膜
- E. 淫秽疫毒与湿热、风邪杂合所致

79. 患者白疮初起，皮损遍身，多呈点滴状，颜色鲜红，层层银屑，瘙痒剧烈，抓之有点状出血，伴口干舌燥，便干溲黄，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。证属

- A. 火毒炽盛证
- B. 湿毒蕴阻证
- C. 气血瘀滞证
- D. 血热内蕴证
- E. 以上均不是

血热内蕴证	血虚风燥证	气血瘀滞证	湿毒蕴阻证	火毒炽盛证
-------	-------	-------	-------	-------

舌红，苔薄黄，脉弦滑或数	舌淡红，苔少，脉沉细	舌紫暗有瘀斑瘀点，脉涩或细缓	有脓疱 舌红，苔黄腻，脉滑	有脓疱 舌红绛，苔黄腻，脉弦滑数
清热凉血，解毒消斑	养血滋阴，润肤息风	活血化瘀，解毒通络	清利湿热，解毒通络	清热泻火，凉血解毒
犀角地黄汤	当归饮子	桃红四物汤	萆薢渗湿汤	清瘟败毒饮

80. 患者皮损初起为针头大小的丘疹，逐渐扩大为绿豆大小的鲜红色斑丘疹，表面覆盖多层干燥银白色鳞屑，刮除鳞屑则露出发亮的半透明的薄膜，再刮除薄膜，出现多个筛状出血点，中医诊断为

- A. 白屑风 ——即旧版之脂溢性皮炎
- B. 牛皮癣
- C. 白疔
- D. 白癜风
- E. 晒斑

81. 患者女性，27 岁。食芒果 7 小时后口周皮肤鲜红肿胀，其上有水疱或大疱，大疱破裂后有糜烂渗液，灼热，瘙痒，伴发热，口渴，大便干结，小便黄，舌红，苔黄，脉弦滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 凉膈散
- B. 黄连解毒汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 化斑汤
- E. 化斑解毒汤合龙胆泻肝汤

风热蕴肤证	湿热毒蕴证	血虚风燥证
起病急，脉浮数	起病急，鲜红肿胀	病程长，皮损肥厚干燥有鳞屑
疏风清热止痒	清热祛湿，凉血解毒	养血润燥，祛风止痒
消风散	龙胆泻肝汤合化斑解毒汤	当归饮子合消风散

82. 患者中年女性，平素纳差，时腹胀便溏，3 天前因劳累后左肋肋部出现带片状红色斑丘疹，继而出现黄豆大小的水疱，红斑颜色较淡，疱壁松弛，伴有灼痛，口不渴，舌淡，苔白或白腻，脉缓，应选用以下何方治疗

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 除湿胃苓汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 桃红四物汤

E. 参苓白术散

肝经郁 <b>热</b> 证	脾虚 <b>湿</b> 蕴证	气滞血瘀证
皮损 <b>鲜红</b> ，灼热刺痛	皮损 <b>色淡</b> ，疼痛不显；食少腹胀便溏	皮疹 <b>消退后</b> ，疼痛不止
清肝泻火，解毒止痛	健脾利湿，解毒消肿	理气活血，通络止痛
龙胆泻肝汤	除湿胃苓汤	柴胡疏肝散 合桃红四物汤

83. 患者男性，25 岁，晨起跑步时偶遇风后全身泛发**风团**，色白，伴瘙痒，发无定处，成批发生，用温水清洗后皮损很快消退，口不渴，舌淡，苔白，脉浮紧。宜选用何方治疗

- A. 消风散
- B. 麻黄桂枝各半汤
- C. 麻黄附子细辛汤
- D. 当归饮子
- E. 四物消风散

风寒束表证	风热犯表证	胃肠湿热证	血虚风燥证
风团 <b>色白</b> ，遇寒加重	风团 <b>鲜红</b> ，灼热 <b>剧痒</b> ，遇热加重	风团 <b>色红</b> ， <b>剧痒</b> ， <b>恶心呕吐</b>	<b>反复发作</b> ，午后或夜间加 <b>剧</b> ，伴手足心热
舌淡红，脉浮紧	舌红，脉浮数	舌红，苔黄腻，脉弦滑数	舌红少津，脉沉细
疏风散寒止痒	疏风清热止痒	疏风解表，通腑泻热	养血祛风，润燥止痒
<b>麻</b> 黄桂枝各半汤	<b>消</b> 风散	<b>防</b> 风通圣散	<b>当</b> 归饮子

84. 患者，男，32 岁，头面部有淡红色斑片，干燥、脱屑、瘙痒，受风加重，口干口渴，大便干燥；舌质偏红，舌苔薄黄，脉细数。治疗首选的方剂是

- A. 八珍汤
- B. 参苓白术散
- C. 四物消风饮
- D. 消风散合当归饮子
- E. 四物汤合六味地黄汤

风热血燥证	肠胃湿热证
多发于头面部，淡红色斑片， <b>干燥</b> ， <b>脱屑</b> ，	皮损为 <b>潮红斑片</b> ，有 <b>油腻性痂屑</b> ，甚至糜烂



瘙痒，受风加重。毛发干枯脱落，伴口干口渴，大便干	渗出，伴口苦口黏，脘腹痞满，小便短赤，大便臭秽
舌质偏红，苔薄白或黄，脉细数	舌红，苔黄腻，脉滑数
祛风清热，养血润燥	健脾除湿，清热止痒
消风散合当归饮子（血行风自灭）	参苓白术散合茵陈蒿汤

85. 患者，女，40 岁，慢性肾病，病程日久，平素头发焦黄，发病时呈大片均匀脱落；伴头昏，耳鸣，目眩，腰膝酸软；舌质淡，舌苔薄，脉细。治疗宜选用

- A. 八珍汤
- B. 大补阴丸
- C. 通窍活血汤
- D. 六味地黄汤
- E. 七宝美髯丹

血热风燥证	气滞血瘀证	气血两虚证	肝肾不足证
突然成片脱发	脱发前先有头痛或肋肋痛	唇白心悸，气短懒言，倦怠乏力	腰膝酸软
舌红，苔薄，脉弦	舌暗红，有瘀斑瘀点	舌淡苔薄白，脉细弱	舌淡，苔薄，脉细
凉血息风，养阴护发	通窍活血，祛瘀生发	益气补血	滋补肝肾
四物汤合六味地黄汤	通窍活血汤	八珍汤	七宝美髯丹

86. A. 消风散  
B. 当归饮子  
C. 龙胆泻肝汤  
D. 参苓白术散  
E. 黄连解毒汤

- (1) 湿疮血虚风燥证首选的方剂是  
(2) 湿疮湿热蕴肤证首选的方剂是

湿热蕴肤证 急性	脾虚湿蕴证 亚急性	血虚风燥证 慢性
发病快，灼热渗液	发病缓，伴纳少腹胀便溏	反复发作，遇热及肥皂水洗后瘙痒加重
清热利湿止痒	健脾利湿止痒	养血润肤，祛风止痒
龙胆泻肝汤合 萆薢渗湿汤	除湿胃苓汤 或参苓白术散	当归饮子 或四物消风饮

87. 陈旧性肛裂伴肛管狭窄者手术时多选用

- A. 扩肛法



- B. 纵切横缝法  
C. 肛裂侧切术  
D. 切开疗法  
E. 挂线疗法

早期肛裂	无结缔组织外痔, 肛乳头肥大等合并症者	扩肛法
陈旧性肛裂	伴结缔组织外痔, 乳头肥大	放射状切开
	不伴结缔组织外痔, 皮下痿等	肛裂侧切术
	伴有肛管狭窄者	纵切横缝法

88. 肛痈浅部脓肿切开时应采取什么切口

- A. 放射状  
B. 十字形  
C. 弧形  
D. 平行纵切开  
E. 梭形

89. 排便或增加腹压时, 直肠黏膜脱出肛门外, 色淡红, 长 **3~5cm**, 质软, 不出血, 便后自行缩回, 肛门括约肌功能良好, 其脱肛的临床分度是

- A. I 度  
B. II 度  
C. III 度  
D. IV 度  
E. V 度

分类	脱出物	脱出长度	特点
一度脱垂	<b>直肠粘膜</b>	<b>3~5cm</b>	脱出物 <b>淡红色</b> , 触之柔软, 无弹性, 不易出血, 便后自行还纳
二度脱垂	<b>直肠全层</b>	<b>5~10cm</b>	脱出物 <b>圆锥状</b> , 淡红色, 表面为环状而有层次的粘膜皱襞, 触之较厚, 有弹性。便后有时需用手回复
三度脱垂	<b>直肠及部分乙状结肠</b>	<b>大于10cm</b>	脱出物 <b>圆柱形</b> , 触之很厚

90. 内痔的好发部位是

- A. 膀胱截石位 11 点  
B. 膀胱截石位 12 点  
C. 膀胱截石位 9 点  
D. 膀胱截石位 7 点  
E. 膀胱截石位 5 点

91. 肛漏手术成败的关键在于

- A. 切除瘻管管壁
- B. 避免损伤内括约肌
- C. 正确找到内口并切开或切除
- D. 将外口及瘻管切除
- E. 以上都不是

92. 挂线疗法的优点主要是

- A. 疗程短
- B. 无疼痛
- C. 不影响肛门功能
- D. 出血少
- E. 以上都不是

93. 肛管直肠癌诊断明确后, 宜首选

- A. 手术根治
- B. 化疗
- C. 中药治疗
- D. 放疗
- E. 以上都不是

94. 患儿男性, 7 岁, 排便时肛门脱出一肿物, 呈环形, 色较鲜红, 便后自行回纳, 有时伴少许出血, 多染于便纸上, 最可能的诊断是

- A. 内痔脱出
- B. 息肉脱出
- C. 一度直肠脱垂
- D. 二度直肠脱垂
- E. 三度直肠脱垂

95. 患者肛门突然剧烈疼痛, 肛门缘周围有暗紫色椭圆形肿块突起, 表面水肿, 其诊断是

- A. 肛管癌
- B. 血栓性外痔
- C. 肛旁脓肿
- D. 肛裂
- E. 内痔嵌顿

96. 患者老年男性, 近来大便次数增多, 伴有排便不尽感, 偶有便血, 量少, 色不鲜。该患者应首先进行的检查方法是

- A. 化验大便常规
- B. 钡灌肠检查
- C. 结肠镜检查
- D. 肛管直肠指诊
- E. 血常规检查

97. 患者女性，30 岁，自觉肛门部不适，排便时因粪便压迫肛隐窝，可感觉肛门疼痛，一般不甚剧烈，数分钟内消失。最可能的诊断是

- A. 直肠息肉
- B. 肛裂
- C. 肛瘘
- D. 肛窦炎
- E. 内痔

98. A. 早期肛裂

- B. 息肉痔
- C. 肛隐窝炎
- D. II 期内痔
- E. 混合痔

(1) 一青年妇女，近月余便时疼痛剧烈，大便秘结，点滴下血，应考虑为

(2) 一 4 岁儿童，大便每日一行，色黄质软，便时下血，首先考虑

99. A. 尿道口常有白色分泌物溢出

- B. 排尿困难、尿潴留
- C. 射精时精液呈淡红色或棕色
- D. 阴茎背侧触及硬结或索状斑块
- E. 以上都不是

(1) 精癯的临床特征是

(2) 阴茎痰核的临床特征是

(3) 精浊的临床特征是

100. 患者，男，65 岁。进行性排尿困难 1 年多。症见精神不振，面色无华，畏寒喜暖，夜尿 5 次/日左右。舌质淡润，苔薄白，脉沉细

(1) 最可能的诊断是

A. 尿石症 ; B. 精浊 ; C. 精癯 ; D. 阴茎痰核 ; E. 子痰

(2) 其治法是

- A. 温补肾阳，通窍利尿
- B. 活血祛瘀，行气止痛
- C. 温阳通脉，化痰散结
- D. 补脾益气，温肾利尿
- E. 清热利湿，消癥通闭

(3) 治疗应首选的方剂是

- A. 八正散
- B. 前列腺汤
- C. 补中益气汤
- D. 济生肾气丸
- E. 阳和汤

湿热下注证	舌黯红，苔黄腻脉滑数	清热利湿，消癥通闭	八正散
脾肾气虚证	神疲乏力，纳谷不香	补脾益气，温肾利尿	补中益气汤

气滞血瘀证	舌紫暗有瘀斑，脉弦或涩	活血行气，通窍利尿	沉香散
肾阴亏虚证	腰膝酸软，五心发热	滋补肾阴，通窍利尿	知柏地黄丸
<b>肾阳不足证</b>	<b>面色无华，畏寒肢冷</b>	<b>温补肾阳，通窍利尿</b>	<b>济生肾气丸</b>

101. 以下哪种疾病易引起肺梗塞

- A. 带状疱疹
- B. 脱疽
- C. 股肿
- D. 浅静脉炎
- E. 褥疮

102. 股肿气虚湿阻证的治法为

- A. 和营活血，清热利湿
- B. 清热利湿，活血通络
- C. 益气健脾，祛湿通络
- D. 凉血清热，活血通络
- E. 化痰软坚，利水消肿

湿热下注证	血脉瘀阻证	气虚湿阻证
<b>舌红，苔黄腻</b> ，脉弦滑	<b>舌暗或有瘀斑</b>	<b>倦怠乏力，边有齿痕</b>
清热利湿， 活血化痰	活血化痰， 通络止痛	益气健脾， 祛湿通络
四妙勇安汤	活血通脉汤	参苓白术散

103. 四妙勇安汤治疗脱疽适用于

- A. 寒湿阻络证
- B. 血脉瘀阻证
- C. 气血两虚型
- D. 热毒伤阴证
- E. 湿热毒盛证

寒湿阻络证	血脉瘀阻证	湿热毒盛证	热毒伤阴证	气阴两虚证
患趾疼痛， <b>多走则加剧</b> 。 稍歇则缓。趺阳脉搏动 <b>减弱</b>	患趾疼痛加重， <b>夜难入寐</b> ， 趺阳脉搏动 <b>消失</b> <b>舌紫暗脉涩</b>	<b>皮肤紫黯</b> ， <b>浸淫蔓延</b> <b>舌红，苔黄腻</b> ，脉弦数	<b>趾（指）呈干性坏疽</b> ，	<b>坏死组织脱落</b> <b>倦怠乏力</b> ， <b>五心烦热</b>
温阳散寒，活血通络	活血化痰，通络止痛	清热利湿，	清热解毒，养	益气养

		解毒活血	阴活血	阴
阻和汤	桃红四物汤	四妙勇安汤	顾步汤	黄芪鳖甲汤

104. 下列哪项不是脱疽局部缺血期的表现

- A. 患肢发凉
- B. 患肢麻木
- C. 患肢足背动脉搏动减弱
- D. 间歇性跛行
- E. 静止痛

105. 青蛇毒湿热瘀阻证选方为

- A. 二妙散合茵陈赤豆汤
- B. 活血通脉汤
- C. 柴胡清肝汤
- D. 复元活血汤
- E. 补中益气汤

湿热瘀阻证	血瘀湿阻证	肝郁蕴结证
红肿胀痛	皮色紫红，小腿部挤压刺痛	胸腹壁有条索状物，固定不移，刺痛，胀痛
苔黄腻或厚腻，脉滑数	舌有瘀斑瘀点，脉沉细或沉涩	舌淡红或有瘀斑瘀点，脉弦或弦涩
清热利湿，解毒通络	活血化痰，行气散结	疏肝解郁，活血解毒
二妙散合茵陈赤豆汤	活血通脉汤	柴胡清肝汤，或复元活血汤

106. A. 寒湿阻络证

- B. 血脉瘀阻证
- C. 湿热毒盛证
- D. 气阴两虚型
- E. 热毒伤阴证

(1) 脱疽患者表现为患肢暗红、紫红或青紫，皮肤发凉干燥，肌肉萎缩，足背动脉搏动消失。患肢疼痛，以夜间为甚，证属

(2) 脱疽患者表现为面容憔悴、萎黄，消瘦，五心烦热，渴不欲饮，患肢肌肉萎缩，皮肤干燥脱屑，趾甲干燥肥厚，创面生长缓慢，肉芽淡而不鲜。证属

寒湿阻络证	血脉瘀阻证	湿热毒盛证	热毒伤阴证	气阴两虚证
患趾疼痛，多走则加剧。稍歇则缓。趺阳脉搏动减弱	患趾疼痛加重，夜难入寐，趺阳脉搏动消失 舌紫暗脉涩	皮肤紫黯，浸淫蔓延 舌红，苔黄	趾（指）呈干性坏疽，	坏死组织脱落 倦怠乏

		臑, 脉弦数		力, 五心烦热
温阳散寒, 活血通络	活血化瘀, 通络止痛	清热利湿, 解毒活血	清热解毒, 养阴活血	益气养阴
阳和汤	桃红四物汤	四妙勇安汤	顾步汤	黄芪鳖甲汤

107. A. 四肢末梢

B. 小腿下部

C. 下肢

D. 四肢或胸壁

E. 以上都不是

(1) 筋瘤好发于

(2) 青蛇毒发于

108. 主要含神经毒的毒蛇是

A. 银环蛇

B. 眼镜王蛇

C. 烙铁头蛇

D. 尖吻蝮蛇

E. 竹叶青蛇

109. 毒蛇咬伤后, 下列局部处理方法错误的是

A. 早期结扎

B. 扩创排毒

C. 艾灸法

D. 烧灼法

E. 封闭疗法

110. 按照中国九分法计算烧伤面积, 双上肢占

A. 5%

B. 9%

C. 18%

D. 36%

E. 以上都不是

111. 水疱性冻疮为冻疮

A. I 度

B. II 度

C. II 度轻型

D. III 度轻型



E. IV度

冻疮的分度

<u>I度</u> <u>(红斑性)</u>	损伤在 <u>表皮层</u> 。局部 <u>皮肤红斑</u> 、水肿,自觉发热、瘙痒或灼痛,愈后不留瘢痕
<u>II度</u> <u>(水疱性)</u>	损伤达 <u>真皮层</u> 。有 <u>水疱或大疱形成</u> ,疱内液体色黄或成血性,疼痛较剧烈
<u>III度</u> <u>(腐蚀性)</u>	损伤达 <u>全皮层</u> 或深及 <u>皮下组织</u> , <u>痛觉迟钝或消失</u> 。 <u>一般呈干性坏疽</u>
<u>IV度</u> <u>(坏死性)</u>	损伤深达 <u>肌肉、骨骼</u> 。局部组织坏死,分为干性坏疽和湿性坏疽。

112. 破伤风的潜伏期一般为

- A. 24 小时
- B. 2~3 天
- C. 4~14 天
- D. 20~30 天
- E. 2~6 个月

113. A. 仙方活命饮加减

- B. 黄连解毒汤合五味消毒饮加减
- C. 大黄牡丹汤加减
- D. 复方大柴胡汤加减
- E. 大黄牡丹汤合透脓散加减
  - (1) 治疗肠痈热毒证的代表方剂是
  - (2) 治疗肠痈湿热证的代表方剂是

瘀滞证	湿热证	热毒证
<u>转移性右下腹痛</u> ,持续性,进行性加重,右下腹局限性压痛,伴恶心纳差,可有轻度发热	腹痛加剧,右下腹或全腹压痛,反跳痛, <u>右下腹可触及包块</u> , <u>壮热</u> ,纳呆,恶心呕吐,便秘或腹泻	腹痛剧烈,全腹压痛,反跳痛, <u>高热</u> 不退或恶寒发热,时时汗出,烦渴,恶心呕吐,腹胀,便秘或似 <u>痢疾不爽</u>
苔白腻,脉弦滑或弦紧	舌红,苔黄腻,脉弦数或滑数	舌 <u>红绛而干</u> ,苔 <u>黄厚干燥或黄燥</u> ,脉洪数或细数
行气活血, <u>通腑泻热</u>	通腑泻热,解毒利湿透脓	通腑排脓,养阴清热
大黄牡丹汤合红藤煎	复方大柴胡汤	<u>大黄牡丹汤</u> 合 <u>透脓散</u>