



701. 急性粒细胞白血病 (ANLL) 首选的是 **DA 方案**。
702. 急性早幼粒细胞白血病 (M3) 首选的是 **全反式维甲酸 (ATRA)**。
703. 急性淋巴细胞白血病 (ALL) 首选的是 **VP 方案 (长春新碱+泼尼松)**。
704. 中枢神经系统白血病首选 **鞘内注射甲氨碟呤 (MTX)**。
705. 慢性粒细胞急变期: **外周血中原粒+早幼粒 > 30%, 骨髓中原粒+早幼粒 > 50%**。
706. 最容易侵犯中枢神经系统白血病多见于 **急性淋巴细胞白血病**。
707. 最容易侵犯睾丸的白血病多见于 **急性淋巴细胞白血病**。
708. 最容易浸润齿龈和皮肤的白血病是: **急性单核细胞白血病**。
709. Auer 小体可见于 **急性粒细胞白血病、M3 等**。
710.  $HB < 70g/L$ : **应考虑输注悬浮红细胞**。
711. 易并发 DIC 而出现全身广泛出血的白血病是: **急性早幼粒细胞白血病 (M3)**。
712. 诊断霍奇金淋巴瘤的必要条件: **R-S 细胞**。
713. 淋巴瘤最常见的临床表现: **慢性、进行性、无痛性淋巴结肿大**。
714. 多发性骨髓瘤肾功能损害的发生机制: **本周蛋白形成管型损伤肾小管; 高血钙; 高尿酸血症等**。
715. 特发性血小板减少性紫癜 (ITP) 首选的治疗药物: **糖皮质激素**。
716. 特发性血小板减少性紫癜 (ITP): **血小板相关抗体和血小板相关补体多数阳性**。
717. 弥散性血管内凝血病因中: **细菌感染最常见**。
718. 需要治疗的无症状性细菌尿: **妊娠期无症状性细菌尿; 学龄前儿童; 曾出现有症状感染者**。
719. 慢性前列腺炎: **尿道口“滴白”**。
720. 泌尿系统结核影像学首选检查: **静脉尿路造影 (IVU)**。
721. 尿路结石的典型表现是: **疼痛和血尿**。
722. 尿路结石首选的检查是: **B 超**。
723. 尿路结石小于 0.6cm 应先首选采用: **保守疗法**。
724. 尿路结石 0.6~2.0cm 的上尿路结石首选: **体外冲击波碎石**。

725. 双侧肾结石的治疗: 双侧肾结石时, 先处理容易取出且安全的一侧。
726. 双侧输尿管结石时, 一般先处理梗阻严重侧。
727. 一侧肾结石, 另一侧输尿管结石时, 先处理输尿管结石。
728. 膀胱结石=膀胱刺激征+排尿突然中断。
729. 泌尿、男生殖系统肿瘤中在我国最常见的是膀胱癌, 其次为肾癌。
730. 泌尿系统肿瘤初期临床表现的特点是: 无痛+全程肉眼血尿。
731. 肾癌最常见的病理类型是透明细胞癌。
732. 肾癌的三大典型表现: 血尿、疼痛和肿块。
733. 肾癌首选的检查方法: B 超。
734. 目前诊断肾癌最可靠的影像学方法是: 腹部 CT。
735. 根治性肾切除术是肾癌最主要的治疗方法。切除范围: 肾+脂肪囊+肾周筋膜+淋巴结。
736. 肾盂癌病理类型: 源于移行上皮细胞乳头状肿瘤。
737. 肾盂癌的早期的临床表现是: 间歇无痛性肉眼血尿。
738. 肾盂癌的膀胱镜检查可见: 输尿管口喷血。
739. 手术切除是治疗肾盂癌最有效的方法。切除的范围: 患肾及全长输尿管, 包括输尿管开口部位的膀胱壁。
740. 膀胱肿瘤: 原位癌 (Tis); 乳头状无浸润 Ta; 黏膜固有层以内 T1; 浸润浅肌层 T2; 浸润深肌层或浸润膀胱周围脂肪组织 T3; 浸润邻近器官 T4。
741. 膀胱肿瘤分布: 肿瘤分布在膀胱侧壁及后壁最多。
742. 前列腺癌: 直肠指检、经直肠 B 超检查和血清前列腺, 异性抗原测定 (PSA)。
743. 睾丸肿瘤: 精原细胞瘤最多见。
744. 前列腺增生: 移行带 (前列腺癌: 外周带)。
745. 进行性排尿困难是前列腺增生的最重要的症状。
746. 前列腺癌首选的最基本的检查是: 直肠指检。
747. 前列腺癌最准确的影像学检查: 经直肠 B 超。
748. 前列腺癌的确诊: B 超引导下穿刺+活检。
749. 前列腺肥大的药物  $\alpha$  受体阻滞剂: 特拉唑嗪 (作用机制: 松弛前列腺内平滑

肌)。

750. 前列腺肥大的药物 5 $\alpha$  还原酶抑制剂: 非那雄胺和度他雄胺。(作用机制: 抑制睾酮变为双氢睾酮)。

751. 良性前列腺增生手术治疗: 经尿道前列腺电切术(TURP)。

752. 急性尿潴留最常见的原因是前列腺增生。

753. 导尿术是解除急性尿潴留最简便常用的方法。

754. 肾损伤首选的检查是: 肾 B 超。

755. 骑跨伤损伤前尿道, 最常见的部位是尿道球部。

756. 骨盆骨折是造成后尿道损伤的最主要原因。

757. 隐睾患儿 > 1HCG 岁: 可短期应用绒毛膜促性腺激素治疗; 无效用睾丸下降固定术。

758. 交通性鞘膜积液: 站立位时阴囊肿大, 卧位时积液流入腹腔, 肿块缩小或消失, 睾丸可扪及。

759. 精索静脉曲张好发于左侧。

760. 成人尿量每天少于 400ml 为少尿。

761. 成人尿量每天少于 100ml 为无尿。

762. 高血钾是急性肾衰患者最常见的死亡原因。

763. 肾衰患者体内电解质紊乱是: 低钠、低钙及高钾、高磷、高镁。

764. 血肌酐超过 442  $\mu\text{mol/L}$  需要血液透析。

765. 血钾超过 6.5mmol/L 需要血液透析。

766. 我国慢性肾功能衰竭最主要原因是慢性肾小球肾炎。

767. 慢性肾脏病 (CKD) 指: 肾损害或  $\text{GFR} < 60\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$  持续 3 个月以上。

768. 慢性肾功能衰竭最早出现的症状经常是在消化系统。

768. 慢性肾功能衰竭最常见的死亡原因是心血管疾病。

769. 稳定性骨折: 嵌插骨折和横形骨折。

770. 骨折后的全身表现是休克和发热。

771. 最容易发生休克的骨折是: 骨盆骨折和股骨干骨折。

772. 骨折后出现发热多为低热 ( $< 38^{\circ}\text{C}$ )。



773. 骨折的专有体征：**畸形；反常活动；骨擦音或骨擦感。**
774. 骨折和脱位首选的影像学检查是：**X 线。**
775. 腰椎间盘突出突出症首选的检查是：**CT。**
776. 早期的股骨头坏死首选的影像学检查是：**MRI。**
777. 转移癌首选的影像学检查是：**核素骨扫描。**
778. 骨折的早期并发症：**休克、脂肪栓塞综合征和骨筋膜室综合征。**
779. 骨筋膜室综合征最常见的部位是：**前臂掌侧和小腿。**
780. 骨筋膜室综合征的治疗：**早期切开减压。**
781. 骨筋膜室综合征最危险的并发症：**缺血性肌挛缩。**
782. 骨折晚期并发症之一损伤性骨化最常见的部位是：**肘关节。**
783. 骨折晚期并发症之一创伤性关节炎最常见的部位是：**胫骨平台骨折。**
784. 胫骨下 1/3 骨折：**延迟愈合和不愈合。**
785. 急救的目的及急救四大原则：**抗休克、包扎伤口、妥善固定、迅速转运。**
786. 骨折的治疗三大原则：**复位；固定；功能锻炼（康复训练）。**
787. 解剖复位较功能复位的优势是：**完全复位。**
788. 骨折功能复位的标准：**旋转分离移位必须完全矫正；成人下肢骨折缩短移位不超过 1cm，儿童不超过 2cm；下肢侧方成角移位，与关节活动方向垂直，必须完全复位；长骨干横形骨折，对位应至少达 1/3，干骺端骨折至少对位达 3/4。**
789. 骨折的愈合过程血肿炎症机化：**一般在伤后 6~8 小时；原始骨痂形成期：成人一般 4~8 周；骨痂改造塑型期：8~12 年。**
790. 锁骨骨折的治疗是：**三角巾悬吊。**
791. 肱骨外科颈为：**肱骨大结节、小结节移行于肱骨干的交界部位。**
792. 肱骨外科颈骨折后的首选的治疗是：**三角巾悬吊患肢。**
793. 肱骨干骨折最容易合并神经损伤是：**桡神经。**
794. 伸直型肱骨髁上骨折移位：**从前下方斜向后上方。**
795. 肱骨髁上骨折伸直型并发的神经损伤：**桡神经、尺神经、正中神经。**
796. Colles 骨折：**“银叉”、“枪刺样”畸形。**
797. Smith 骨折：**远折端向掌侧、桡侧移位。**
798. 孟氏（Monteggia）骨折：**尺骨上 1/3 骨折合并桡骨小头半脱位。**



799. 盖氏 (Glazziz) 骨折: 桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位。

800. Chance 骨折: 椎体水平状撕脱骨折。

