



临床助理医师考试:《答疑周刊》2021年第10期

【儿科疾病】

1. 正常4个月小儿按体重公式计算,标准体重应是

- A. 5.5kg
- B. 5.6kg
- C. 5.7kg
- D. 5.8kg
- E. 6.5kg

【正确答案】E

【答案解析】正常新生儿出生体重平均是3.25kg。

为了便于临床应用,可按以下公式粗略估计小儿体重:

3~12个月: 体重(kg) = (月龄+9) / 2

2. 新生儿缺氧缺血性脑病诊断主要靠

- A. B超
- B. MRI
- C. 临床表现
- D. EEG
- E. CT

【正确答案】C

【答案解析】新生儿缺氧缺血性脑病主要是根据临床表现和有窒息史来诊断。

3. 麻疹的出疹顺序为

- A. 面部→躯干→四肢 1日出齐
- B. 颈部→四肢→躯干 1日出齐
- C. 耳后、颈部发际→面部、躯干、上肢→下肢足部 3日出齐
- D. 耳后、颈部发际→面部、躯干、上肢→下肢足部 1日出齐
- E. 面部→四肢→躯干 3日出齐

【正确答案】C

【答案解析】多在发热3~4天后出现皮疹,此时全身中毒症状加重,体温骤然升高,可达40~40.5℃,咳嗽加剧,出现烦躁或嗜睡,重者有谵妄、抽搐(疹



出热盛), 持续 3~4 天。皮疹先见于耳后、发际, 渐及额部、面部、颈部, 然后自上而下延至躯干和四肢, 最后达手掌和足底。

4. 一个健康儿体重 7.5kg, 身长 67cm, 会翻身, 能独坐, 不会爬, 能发出“爸爸”、“妈妈”等复音, 但无意识, 能听懂自己的名字, 其月龄最可能为

A. 3~4 个月

B. 5 个月

C. 6 个月

D. 7 个月

E. 8 个月

【正确答案】D

【答案解析】婴儿体格与动作发育分析

①从体重、身长判断发育; ②从婴儿动作发育, “7 个月会坐、8 个月爬”判断;

③语言发育: 会发双音节, 均符合 7 个月婴儿。

5. 足月儿, 出生时羊水墨绿色, 全身皮肤青紫, 心率 90 次/分, 弹足底皱眉, 四肢略屈曲, 无呼吸。

(1) 此时处理中最重要的是

A. 药物治疗

B. 碳酸氢钠纠正酸中毒

C. 给氧

D. 保暖

E. 吸净呼吸道黏液, 保持呼吸道通畅

【正确答案】E

【答案解析】患儿考虑有宫内窒息史, 首先应该清理呼吸道, 保持呼吸道通畅。

(2) 可诊断为

A. 新生儿肺透明膜病

B. 新生儿败血症

C. 新生儿重度窒息

D. 新生儿轻度窒息

E. 新生儿宫内感染



【正确答案】 C

【答案解析】 全身皮肤青紫 0 分, 心率 90 次/分, 1 分, 弹足底皱眉, 1 分, 四肢略屈曲, 1 分, 无呼吸, 0 分, 所以一共是 3 分, 应该是重度窒息。

(3) 该患儿在治疗过程中出现烦躁, 激惹, 四肢抽动, 前囟 3cm×3cm, 紧张, 颅缝增宽。应考虑存在

- A. 先天性脑发育不良
- B. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 低钙血症
- E. 新生儿缺氧缺血性脑病

【正确答案】 E

【答案解析】 患儿有窒息史, 出现神经系统状况, 前囟紧张, 考虑是新生儿缺氧缺血性脑病。

(4) 针对上述表现, 下列哪项治疗措施不妥当

- A. 维持正常血压
- B. 控制入液量 60ml/kg
- C. 20%甘露醇 0.5g/kg 静脉推注
- D. 腰椎穿刺放脑脊液
- E. 心率、呼吸监护

【正确答案】 D

【答案解析】 患儿出现颅高压或者脑水肿, 可以呋塞米或者甘露醇治疗, 一般是不用放脑脊液治疗。

