

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2021年第11期

1. 【问题】小儿惊厥止惊到底是用地西洋，还是苯巴比妥？

【解答】针对不同情况引起的惊厥首选药物不同。


破伤风引起的惊厥和小儿单纯惊厥均是首选地西洋。

新生儿缺血缺氧性脑病控制惊厥首选苯巴比妥，肝功能不全者改用苯妥英钠，顽固性抽搐者加用安定或水合氯醛。

新生儿颅内出血控制惊厥首选苯巴比妥，还可选用地西洋、水合氯醛等。

这几种都可用，但是要区别首选的药物。

胎心位置与胎位的关系：



请牢记胎方位的各个位置，见下图。

胎方位	枕左前	枕右前	骶左前	骶右前	肩左前	肩右前
	LOA 头位	ROA 头位	LSA 臀位	RSA 臀位	LscA 横位	RscA 横位
胎臀位置	宫底	宫底	子宫下段	子宫上段	腹右侧	腹左侧
胎头位置	子宫下段	子宫上段	宫底	宫底	腹左侧	腹右侧
胎背位置	左前	右前	左前	右前	朝腹壁	朝腹壁
胎肢位置	右后	左后	右后	左后	朝母背	朝母背
胎心音位置	脐左下	脐右下	脐左上	脐右上	脐左	脐右
子宫外形	纵	纵	纵	纵	马鞍	马鞍

3. 【问题】吸痰不是先口腔咽部再气管吗？气管切开病人先吸气管套管处，再吸口腔？

【解答】普通病人：先吸净口腔咽喉的分泌物后，再吸气管内分泌物，每次吸痰时间应小于 15 秒，以防缺氧。

气管切开病人：先气管，后口腔。但是做题时也需要看具体题目，区分前提条件。

4. 【问题】严密性隔离适合什么样患者？

【解答】严密隔离：用于鼠疫、霍乱、非典等。

主要隔离措施：

①病人住单人房间，室内物品应尽可能简单并耐消毒，门口挂有醒目标志，病人不得离开病室，不得随意开启门窗，禁止探视。

②进入病室，必须戴口罩、帽子，穿隔离衣、隔离鞋，戴手套。

③物品一经进入病室即视为污染，均应严格消毒处理，污染的敷料装袋标记并送焚烧处理。

④室内空气、地面及距地面 2m 以下的墙壁、家具，每日消毒 1 次。

