

医学教育网中级主管护师：《答疑周刊》2021 年第 13 期

1. 【问题】心脏瓣膜病听诊部位？

【解答】

心脏瓣膜病	听诊部位	特殊性杂音
二尖瓣狭窄	心尖部	舒张期隆隆样杂音
二尖瓣关闭不全	心尖部	全收缩期粗糙吹风样
主动脉瓣狭窄	主动脉瓣区	响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音
主动脉瓣关闭不全	主动脉瓣区	舒张早期叹气样杂音

2. 【问题】中暑常见类型的区别？

【解答】

分类	表现	体温
热衰竭 (中暑衰竭)	头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、出冷汗、脉搏细数、 血压下降、昏厥或意识模糊	基本正常
热痉挛 (中暑痉挛)	腓肠肌痉挛最为多见	多正常
日射病	剧烈头痛、头晕、眼花、耳鸣、呕吐、烦躁不安， 昏迷、惊厥	头温高，体温不高
热射病 (中暑高热)	早期：头痛、头昏、乏力、多汗，体温迅速 $\uparrow > 40^{\circ}\text{C}$ ， 皮肤干热，无汗、谵妄和昏迷，抽搐，脉搏 \uparrow ，血 压 \downarrow ，呼吸浅速 休克、脑/肺水肿、DIC、肝/肾功能损害	体温升高

3. 【问题】常见几种穿刺液/灌洗液性质区别？

【解答】

病因	穿刺液/灌洗液性质
结核性腹膜炎	草绿色透明腹水
胃十二指肠急性穿孔	黄色、浑浊、含胆汁、无臭味的抽出液
急性重症胰腺炎	血性、胰淀粉酶含量高
绞窄性肠梗阻	抽出液为血性、臭味重
抽出液为不凝血	应怀疑有腹腔内出血

4. 【问题】心绞痛与心肌梗死的区别？



【解答】

区别点	心绞痛	心肌梗死
疼痛性质	压迫感、发闷、紧缩感、偶有濒死感	与心绞痛相似，更剧烈，有濒死感
持续时间	3~5 分钟内，一般不超过 15 分钟	数小时或数天
缓解方式	休息或含服硝酸甘油可缓解	休息和含服硝酸甘油不缓解
诱发因素	常在体力劳动或情绪激动时、饱餐、寒冷、吸烟、休克等	一般无明显诱因

