

口腔主治医师考试:《答疑周刊》2022年第3期

【口腔组织病理学】

根尖周肉芽肿患者若根尖部出现修复性反应,称为

- A. 急性根尖周肉芽肿
- B. 慢性根尖周脓肿
- C. 急性根尖周脓肿
- D. 致密性骨炎
- E. 化脓性骨髓炎





【正确答案】D

【答案解析】肉芽肿可呈现修复性反应,炎症减轻,吸收处骨质重新沉积,骨小梁增生,骨髓腔缩小,骨髓被纤维组织取代。与此同时牙骨质也可在根面沉积,产生牙骨质过度增生,称为致密性骨炎。【医学教育网原创】

【口腔黏膜病学】

疱疹性咽峡炎的病原体是

- A. 牙龈卟啉单胞菌
- B. HSV





- C. 柯萨奇病毒 A4
- D. 柯萨奇病毒 A16
- E. 变形链球菌

【正确答案】C



【答案解析】疱疹性咽峡炎是由柯萨奇病毒 A4 所引起的口腔疱疹损害,临床表现较相似急性疱疹性龈口炎。故答案为 C。【医学教育网原创】

【口腔修复学】

按照无牙颌解剖特点, 切牙乳突属于

- A. 主承托区
- B. 副承托区





- C. 缓冲区
- D. 后堤区
- E. 边缘封闭区

【正确答案】C

医学教育网

【答案解析】缓冲区:无牙颌的骨性隆突部位,如上颌隆突、颧突、上颌结节的颊侧、下颌隆突、下颌舌骨嵴以及牙槽嵴上的骨尖、骨棱等部位,表面被覆黏膜较薄,切牙乳突内有神经和血管。这些部位均不能承受咀嚼压力,全口义齿基托组织面在上述的相应部位应做缓冲



处理,以免因压迫导致疼痛,或形成支点而影响义齿的稳定。【医学教育网原创】

【口腔颌面外科学】

下列属于对放射不敏感的肿瘤是

- C. 浆细胞肉瘤
- D. 恶性淋巴瘤
- E. 恶性黑色素瘤





【正确答案】E

【答案解析】对放射不敏感的肿瘤:应以手术治疗为主,手术前后可给以化学药物作为辅助治疗,这类肿瘤如骨肉瘤、纤维肉瘤、恶性黑色素瘤等。【医学教育网原创】









www.med66.com







