

医学教育网口腔主治医师:《答疑周刊》2022 年第 25 期

问题索引:

- 1. 引起细菌性心内膜炎的微生物是?
- 2. 球菌性口炎患者用什么漱口水比较好?
- 3. 什么是截根术?
- 4. 戴全口义齿出现咬舌,应该怎么调改义齿?

具体解答:

1. 引起细菌性心内膜炎的微生物是?

拔牙后引起细菌性心内膜炎的细菌微生物是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 甲型溶血性链<mark>球菌</mark>
- C. 乙型溶血性链球菌
- D. 肺炎双球菌
- E. 表皮葡萄球菌

【答案】B

【解析】细菌性心内膜炎的病死率很高,引起细菌性心内膜炎重要因素之一 是草绿色链球菌(甲型溶血性链球菌)[医学教育网原创]菌血症。

ed66.cor

2. 球菌性口炎患者用什么漱口水比较好?

球菌性口炎局部治疗常用的漱口水是

- A. 0. 05%洗必泰 (氯己定)液
- B. 聚维酮碘漱口液
- C. 0. 1%利凡诺液
- D. 3%双氧水
- E. 0. 05%高锰酸钾液

【答案】B

【解析】球菌性口炎局部治疗多用聚维酮碘漱口液含漱,西地碘含片,溶菌酶片,地喹氯铵含片,[医学教育网原创]也可用 0.2%氯己定漱口液含漱。故答



案为 B。

3. 什么是截根术?

将患根分叉病变的多根牙中破坏最严重的牙根截除,同时保留牙冠和其余的 牙根,继续行使功能,此种方法是

- A. 翻瓣术
- B. 植骨术
- C. 引导性组织再生术
- D. 截根术
- E. 牙半切术

【答案】D

【解析】截根术: 将患根分叉病变的多根牙中破坏最严重的一个或两个牙根截除消灭分叉区病变,[医学教育网原创]同时保留牙冠和其余的牙根,继续行使功能。

4. 戴全口义齿出现咬舌,应该怎么调改义齿?

戴全口义齿出现咬舌现象, 需磨改

- A. 上后牙舌尖舌斜面和下后牙舌尖颊斜面
- B. 上后牙<mark>舌尖颊斜</mark>面和下后牙舌尖颊斜面
- C. 上后牙颊尖颊斜面和下后牙颊尖颊斜面
- D. 上后牙颊尖舌斜面和下后牙颊尖颊斜面
- E. 上后牙颊尖舌斜面和下后牙舌尖颊斜面

【答案】A

【解析】咬颊、咬舌: [医学教育网原创]由于后牙缺失时间过久,两颊部向内凹陷,或舌体变大而造成咬颊或咬舌现象,经过戴用一段时间后,常可自行改善。必要时可加厚颊侧基托,将颊部组织推向外侧。如果由于后牙排列覆盖过小,出现咬颊或咬舌时,可磨改上颌后牙颊尖舌侧斜面和下后牙颊尖的颊侧斜面,加大覆盖,解决咬颊现象。咬舌,可磨改上颌后牙舌尖舌侧斜面和下后牙舌尖颊侧斜面。