

医学教育网初级护师:《答疑周刊》第36期

问题索引:

1. 【问题】阿托品化和阿托品中毒的症状有何区别?
2. 【问题】实质性脏器破裂和血管损伤的临床表现?
3. 【问题】胃、十二指肠溃疡好发部位?
4. 【问题】压力负荷过重常见于什么疾病?

具体解答:

1. 【问题】阿托品化和阿托品中毒的症状有何区别?

【解答】当病人有机磷农药中毒时,需要给予阿托品进行抢救,给予的阿托品的量应使患者出现阿托品化为止,当阿托品量过多会出现阿托品中毒。

阿托品化:患者瞳孔较前扩大、颜面潮红、口干、皮肤干燥、肺部湿啰音减少或消失、心率加快等。[医学教育/网]

阿托品中毒:意识模糊、烦躁不安、谵妄、抽搐、瞳孔扩大、昏迷和尿潴留等。两者的症状不同,要注意区分记忆。

2. 【问题】实质性脏器破裂和血管损伤的临床表现?

【解答】

实质性脏器	肝、脾、胰、肾等
临床表现	腹腔内出血,病人精神紧张、面色苍白、出冷汗、脉搏快而细弱、血压下降和尿少等失血性休克表现;腹痛呈持续性,多不严重;出血多者有腹胀和移动性浊音(>1000ml);腹部压痛、反跳痛和腹肌紧张不剧烈[医学教育/网] =失血性休克+腹痛+轻微腹膜刺激征+诊断性穿刺不凝血
肝、肾、胰腺破裂	因有胆汁、尿液或胰液进入腹腔,可出现明显的腹膜刺激征

3. 【问题】胃、十二指肠溃疡好发部位?

【解答】胃溃疡好发于胃角和胃窦、胃体的胃小弯；十二指肠溃疡好发于球部前壁。

4. **【问题】**压力负荷过重常见于什么疾病？

【解答】压力负荷（后负荷）过重：见于高血压、主动脉瓣狭窄、肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄等，以及左、右心室收缩期射血阻力增加的疾病。

容量负荷（前负荷）过重：见于二尖瓣、主动脉瓣关闭不全；房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭；以及伴有全身血容量增多疾病，如甲状腺功能亢进症、慢性贫血等。

