

医学教育网乡村全科助理医师:《答疑周刊》2022年第22期

肝硬化是由一种或几种病因长期、反复作用所致的慢性肝脏疾病。其病理学特点为肝细胞广泛变性、坏死,残存肝细胞结节性再生,肝组织弥漫性纤维化及假小叶形成。分为代偿期和失代偿期。

问题索引:

1. 肝硬化腹水形成的决定性因素是什么?
2. 肝性脑病的诱因有?
3. 肝硬化最常见的并发症是?

具体解答:

1. 肝硬化腹水形成的决定性因素是
  - A. 中心静脉压增高
  - B. 门静脉高压
  - C. 醛固酮分泌增加
  - D. 抗利尿激素增加
  - E. 肝内淋巴液容量增加和淋巴回流不畅

【正确答案】B

【答案解析】肝硬化患者由于门脉高压,腹腔内脏血管床静水压增高,组织液回吸收减少而漏入腹腔,是腹水形成的决定性因素。中心静脉压主要用于了解有效循环血容量和心功能。醛固酮分泌增加、抗利尿激素增加、肝内淋巴液容量增加和淋巴回流不畅也是腹水形成的因素,但不是决定性因素。

2. 肝性脑病的诱因不包括
  - A. 消化道出血
  - B. 高钾性酸中毒
  - C. 便秘
  - D. 低血糖
  - E. 缺氧

【正确答案】B

**【答案解析】**肝性脑病常见的诱因有：上消化道出血、大量排钾利尿、感染、放腹水、低钾导致的代谢性碱中毒、高蛋白饮食、安眠镇静药、麻醉药、便秘、尿毒症和外科手术等。葡萄糖是大脑产生能量的重要燃料，低血糖时能量减少，脑内去氨活动停滞，氨的毒性增加，所以低血糖也会引起肝性脑病。3. 肝硬化最常见的并发症是

- A. 门静脉血栓形成
- B. 原发性肝癌
- C. 肝性脑病
- D. 上消化道大出血
- E. 自发性腹膜炎

**【正确答案】**D

**【答案解析】**上消化道出血：为肝硬化最常见的并发症。原因为食管下端或胃底静脉曲张破裂或并发急性胃黏膜糜烂、消化性溃疡。