

医学教育网主管药师:《答疑周刊》2022年第52期

问题索引:

1. 【问题】抗高血压药物典型不良反应和禁忌证有哪些?
2. 【问题】心肌梗死的治疗的溶栓禁忌证有哪些?

具体解答:

1. 【问题】抗高血压药物典型不良反应和禁忌证有哪些?

药物	典型不良反应	禁忌症
ACEI类 (**普利)	刺激性干咳、血钾升高	双侧肾动脉狭窄、高血压、妊娠期禁用
ARB类 (**沙坦)	血钾升高	
β 受体阻断剂 (**洛尔)	支气管痉挛、心功能抑制、影响糖脂代谢	哮喘禁用、反复低血糖发作者慎用
CCB类	二氢吡啶类:足踝部水肿、头痛、面部潮红	二氢吡啶类:心衰患者慎用 非二氢吡啶类:心衰患者禁用
噻嗪类利尿剂	血钾、钠降低,血尿酸升高	痛风禁用
保钾利尿剂(阿米洛利、氨苯蝶啶)	血钾升高	
醛固酮受体阻断剂(螺内酯)	血钾升高,男性乳房发育	
α 受体阻断剂 (**唑嗪)	体位性低血压	

2. 【问题】心肌梗死的治疗的溶栓禁忌证有哪些?

溶栓禁忌证	<ol style="list-style-type: none"> ①既往任何时间脑出血病史者。 ②脑血管结构异常者(如动静脉畸形)。 ③颅内恶性肿瘤(原发或转移)患者。 ④6个月内缺血性卒中或短暂性脑缺血史者(不包括3小时内的缺
-------	--

血性卒中患者)。

⑤可疑主动脉夹层者。

⑥活动性出血或者出血素质者(不包括月经来潮)。

⑦3个月内的严重头部闭合性创伤或面部创伤者。

⑧慢性、严重、没有得到良好控制的高血压或目前血压严重控制不良者(收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$ 或者舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$)。

⑨痴呆或已知的其他颅内病变患者。

⑩创伤(3周内)或者持续 > 10 分钟的心肺复苏,或者3周内进行过大大手术者。

⑪近期(4周内)内脏出血者。

⑫近期(2周内)不能压迫止血部位的大血管穿刺者。

⑬感染性心内膜炎患者。

⑭5日至2年内曾应用过链激酶,或者既往有此类药物过敏史者(不能重复使用链激酶)。

⑮妊娠期妇女。

⑯活动性消化性溃疡患者。

⑰目前正在应用抗凝血剂的患者(国际标准化比值(INR)水平越高,出血风险越大)。

另外,根据综合临床判断,患者的风险/效益比不利于溶栓治疗,尤其是有出血倾向者,包括严重肝、肾疾病,恶病质,终末期肿瘤等