

医学教育网口腔主治医师：《答疑周刊》2023年第12期

问题索引：

1. 药物致畸最敏感的时期是在妊娠什么时候？
2. 腺周口疮的预后怎么样？
3. 翻瓣术后最常见愈合方式是哪一种？
4. 下颌后部牙槽嵴骨吸收有什么特点？

具体解答：

1. 药物致畸最敏感的时期是在妊娠什么时候？

药物致畸最敏感的时期是在妊娠

- A. 12 周内
- B. 16 周内
- C. 24 周内
- D. 28 周内
- E. 32 周内

【答案】A

【解析】妊娠期妇女最好不用或少用药物，用药也应在医师指导下使用。许多药物能通过胎盘屏障进入胎儿体内，[医学教育网原创]导致胎儿畸形。妊娠12周内是药物致畸最敏感的时期。

2. 腺周口疮的预后怎么样？

腺周口疮的预后是

- A. 癌变
- B. 涎腺化生
- C. 转成结核性溃疡
- D. 愈合后遗留瘢痕
- E. 转成疱疹样口疮

【答案】D

【解析】腺周口疮又称为重性阿弗他溃疡，[医学教育网原创]创面大，疼痛

程度高，溃疡深大，愈合后会留有瘢痕。

3. 翻瓣术后最常见愈合方式是哪一种？

目前翻瓣术后最常见愈合方式为

- A. 骨结合
- B. 胶原连结
- C. 长结合上皮愈合
- D. 新附着
- E. 细胞结合

【答案】C

【解析】长结合上皮愈合：[医学教育网原创]在袋内壁与原来暴露于牙周袋内的牙根表面之间有一层长而薄的结合上皮，称为长结合上皮，以半桥粒体和基底板的方式连接。这种愈合方式称为长结合上皮愈合，但并非真正的附着获得。这是翻瓣术后最常见的愈合方式。

4. 下颌后部牙槽嵴骨吸收有什么特点？

下颌后部牙槽嵴骨吸收的方向为

- A. 向下、向后
- B. 向下、向外
- C. 向下、向内
- D. 向后、向外
- E. 向下、向前

【答案】B

【解析】下颌后部牙槽嵴骨吸收的方向为向下、[医学教育网原创]向外。