

医学教育网中医执业助理医师:《答疑周刊》2023年第5期

问题索引:

1. 消化性溃疡并发穿孔的表现与体征有哪些, 如何确定诊断?
2. 流行性出血热低血压休克期有哪些临床表现?
3. 脑脊液检查的适应证与禁忌证有哪些?

具体解答:

1. 消化性溃疡并发穿孔的表现与体征有哪些, 如何确定诊断?

患者十二指肠溃疡病史7年, 饮酒后突发上腹剧痛, 查体呈板状腹, 拟诊为急性穿孔, 确诊最重要的检查是

- A. 粪便隐血试验
- B. 腹腔穿刺
- C. 腹部X线透视
- D. 钡餐透视
- E. 血常规

【答案】C

【解析】消化性溃疡并发穿孔: 穿孔发生率DU高于GU。溃疡穿透胃肠壁达游离腹腔, 导致急性弥漫性腹膜炎称为急性穿孔或游离穿孔; 溃疡穿透胃肠壁并与邻近器官粘连, 称为穿透性溃疡或慢性穿孔。患者突发上腹部持续性剧烈疼痛, 并迅速弥漫全腹, 伴休克表现, 查体腹部压痛, 有反跳痛, 呈板状腹, 肝浊音界缩小或消失, 肠鸣音减弱或消失, 外周血白细胞及中性粒细胞增高, 腹部X线透视见膈下游离气体影, 是诊断穿孔的重要依据[医学教育网原创]。

2. 流行性出血热低血压休克期有哪些临床表现?

流行性出血热低血压休克期的主要特点是

- A. 热退后病情反而加重
- B. 体温逐渐上升
- C. 血小板增多
- D. 中性粒细胞增多

E. 出现三红征

【答案】A

【解析】流行性出血热低血压休克期，主要为低血容量休克的表现。一般发生于第4~6病日，迟者可于8~9日出现。热退后病情反而加重是本期的特点。体温开始下降或退热后不久，患者出现低血压，重者发生休克。可引起DIC、心力衰竭、水及电解质平衡失调、脑水肿、呼吸窘迫综合征、急性肾衰竭（多脏衰）等。本期多不超过24小时，时间越长，病情越重[医学教育网原创]。

3. 脑脊液检查的适应证与禁忌证有哪些？

脑脊液检查的适应证应除外

- A. 有脑膜刺激症状需明确诊断者
- B. 疑有颅内出血
- C. 疑有颅内压显著增高
- D. 疑有中枢神经系统恶性肿瘤
- E. 有剧烈头痛、昏迷、抽搐及瘫痪等表现而原因未明者

【答案】C

【解析】脑脊液检查的适应证：

- (1) 有脑膜刺激症状需明确诊断者。
- (2) 疑有颅内出血。
- (3) 疑有中枢神经系统恶性肿瘤。
- (4) 有剧烈头痛、昏迷、抽搐及瘫痪等表现而原因未明者。
- (5) 中枢神经系统手术前的常规检查。

禁忌证：

- (1) 颅内压明显增高或伴显著视乳头水肿者。
- (2) 有脑疝先兆者。
- (3) 处于休克、衰竭或濒危状态者。
- (4) 局部皮肤有炎症者。
- (5) 颅后窝有占位性病变者[医学教育网原创]。