

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2023年第34期

问题索引:

1. 肝胃不和证与肝郁脾虚证如何鉴别?
2. 不同的恶性肿瘤淋巴结经常转移的部位是什么?
3. 不同类型肺癌的治疗方法如何选择?

具体解答:

1. 肝胃不和证与肝郁脾虚证如何鉴别?

肝胃不和与肝郁脾虚证的共同表现是

- A. 太息易怒
- B. 吞酸嘈杂
- C. 呃逆暖气
- D. 腹痛欲泻
- E. 便溏不爽

【答案】A

【解析】肝胃不和与肝郁脾虚均有肝气郁结, 而见胸胁胀满疼痛、情志抑郁或烦躁等表现, 但肝胃不和证兼胃失和降, 常有胃脘胀痛、暖气、呃逆等症; 肝郁脾虚证兼脾失健运, 常有食少、腹胀、便溏等症[医学教育网原创]。

肝胃不和证临床表现: 胃脘、胁肋胀满疼痛, 走窜不定, 暖气, 吞酸嘈杂, 呃逆, 不思饮食, 情绪抑郁, 善太息, 或烦躁易怒, 舌淡红, 苔薄黄, 脉弦。

肝郁脾虚证临床表现: 胸胁胀满窜痛, 善太息, 情志抑郁, 或急躁易怒, 食少, 腹胀, 肠鸣矢气, 便溏不爽, 或腹痛欲便、泻后痛减, 或大便溏结不调, 舌苔白, 脉弦或缓[医学教育网原创]。

2. 不同的恶性肿瘤淋巴结经常转移的部位是什么?

胃癌发生淋巴结转移时常出现在

- A. 右锁骨上窝
- B. 左锁骨上窝
- C. 颈部

- D. 腋窝
- E. 滑车上

【答案】 B

【解析】恶性肿瘤转移所致的淋巴结肿大，质硬或有橡皮样感，一般无压痛，表面光滑或有突起，与周围组织粘连而不易推动。左锁骨上窝淋巴结肿大，多为腹腔脏器癌肿（胃癌、肝癌、结肠癌等）转移；右锁骨上窝淋巴结肿大，多为胸腔脏器癌肿（肺癌等）转移。鼻咽癌易转移到颈部淋巴结；乳腺癌最早经胸大肌外侧缘淋巴管侵入同侧腋下淋巴结[医学教育网原创]。

3. 不同类型肺癌的治疗方法如何选择？

张某，60岁。干咳、胸痛、发热、消瘦1个月，经检查诊断为小细胞肺癌，其治疗首选

- A. 化疗
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 干扰素
- E. 集落刺激因子

【答案】 A

【解析】肺癌的治疗策略应根据患者一般情况、肺癌的病理学类型、临床分期综合决策，强调个体化的综合性治疗。小细胞肺癌发现时已转移，难以通过外科手术根治，主要依赖化疗或放、化疗综合治疗。相反，非小细胞肺癌可为局限性，外科手术或放疗效果好，但对化疗的反应较小细胞肺癌差[医学教育网原创]。