

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2023年第29期

问题索引:

1. 【问题】中心静脉压的临床意义?
2. 【问题】复苏药物的应用?
3. 【问题】意识障碍分级标准?

具体解答:

1. 【问题】中心静脉压的临床意义?

【解答】

CVP	BP	原因	处理
↓	低	血容量严重不足	充分补液
↓	正常	血容量不足	适当补液
↑	低	心功能不全	强心
↑	正常	容量血管过度收缩	扩管
正常	低	心功能不全或血容量不足	补液试验

2. 【问题】复苏药物的应用?

【解答】

- (1) 首选采用静脉给药, 其次是气管内给药, 最后才考虑心内注射。
- (2) 肾上腺素: 心脏复苏的首选药。
- (3) 利多卡因: 抗心律失常首选药——治疗室颤。
- (4) 碳酸氢钠——纠正代谢性酸中毒的首选药。
- (5) 中枢神经系统处于严重缺氧状态, 用呼吸兴奋药可能加速中枢衰竭, 所以要视情况给用洛贝林、二甲弗林、咖啡因, 在心跳未恢复前不宜应用。

3. 【问题】意识障碍分级标准?

【解答】(1) 嗜睡: 最轻度的意识障碍。病人处于持续睡眠状态, 但能被言语或轻度刺激唤醒, 醒后能正确、简单而缓慢地回答问题, 但反应迟钝, 刺激去除后又很快入睡。

(2) 意识模糊: 其程度较嗜睡深, 表现为思维和语言不连贯, 对时间、地点、人物的定向力完全或部分发生障碍, 可有错觉、幻觉、躁动不安、谵语或精神错乱。

(3) 昏睡: 病人处于熟睡状态, 不易唤醒。压迫眶上神经、摇动身体等强刺激可被唤醒, 醒后答话含糊或答非所问, 停止刺激后即又进入熟睡状态。

(4) 昏迷: 最严重的意识障碍, 按其程度可分为: ①浅昏迷: 意识大部分丧失, 无自主运动, 对声、光刺激无反应, 对疼痛刺激(如压迫眶上缘)可有痛苦表情及躲避反应。瞳孔对光反射、角膜反射、眼球运动、吞咽反射、咳嗽反射等可存在。呼吸、心跳、血压无明显改变, 可有大小便失禁或潴留。②深昏迷: 意识完全丧失, 对各种刺激均无反应。全身肌肉松弛, 肢体呈弛缓状态, 深浅反射均消失, 偶有深反射亢进及病理反射出现。机体仅能维持循环与呼吸的最基本功能, 呼吸不规则, 血压可下降, 大小便失禁或潴留。