

医学教育网内科主治医师:《答疑周刊》2024年第2期

消化内科学在内科主治医师考试中是相对来说比较简单的一科,但是零碎的内容比较多,还是需要大家重点复习,今天一起来做几道上消化道出血的题目。

问题索引:

1. 急性胃炎的急诊胃镜检查应在上消化道出血后多久进行?
2. 哪些指标可以判断消化道活动性出血的指标?
3. 上消化道出血部位是哪里?

具体解答:

1. 急性胃炎的急诊胃镜检查应在上消化道出血后多久进行?

急性胃炎的急诊胃镜检查应在上消化道出血后

- A. 一周内进行
- B. 5 天内进行
- C. 4 天内进行
- D. 3 天内进行
- E. 1~2 天内进行

【答案】 E

【解析】 强调急诊内镜检查宜在出血发生后 24~48 小时内进行,因某些病变(特别是 NSAID 或乙醇)引起者可在短期内消失,延迟胃镜检查可能无法确定出血病因。[医学教育网原创]

2. 哪些指标可以判断消化道活动性出血的指标?

不能判断消化道活动性出血的指标是

- A. 网织红细胞
- B. 血红蛋白
- C. 血沉
- D. 血细胞
- E. 尿素氮

【答案】 C

【解析】 以下几点可判断活动性出血:反复呕血或黑粪次数增多、粪质稀薄,

甚至呕血转为鲜红色、黑粪变成暗红色，伴有肠鸣音亢进；周围循环衰竭的表现经补液输血而血容量未见明显改善，或好转后又恶化，经快速补液输血，中心静脉压仍有波动(下降)；红细胞计数、血红蛋白测定与血细胞比容、血细胞压积继续下降，网织细胞计数持续增高；补液与尿量足够的情况下，血尿素氮持续或再次增高。血沉不是判断活动性出血的指标。

3. 上消化道出血部位是哪里？

上消化道出血部位是

- A. 贲门以上出血
- B. 幽门以上出血
- C. Trietz 韧带以上出血
- D. 空回肠交界处以上出血
- E. 回盲部以上出血

【答案】 C

【解析】 上消化道出血是指屈氏韧带以上的消化道，包括食管、胃、十二指肠或胰胆等病变引起的出血。所以应该是以 Trietz 为界。[医学教育网原创]