

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2024年第12期

问题索引:

1. 【问题】地西洋和苯巴比妥用于小儿惊厥的区别?
2. 【问题】全程血尿, 提示?
3. 【问题】尿失禁如何区分?

具体解答:

1. 【问题】地西洋和苯巴比妥用于小儿惊厥的区别?

【解答】控制惊厥的用药区分:

新生儿破伤风和小儿惊厥——首选地西洋。

新生儿缺血缺氧性脑病和新生儿颅内出血——首选苯巴比妥。

新生儿缺血缺氧性脑病者, 若肝功能不全, 就改为苯妥英钠。

2. 【问题】全程血尿, 提示?

【解答】根据出血部位与血尿出现阶段的不同, 肉眼血尿可分为: ①初始血尿, 提示病变在尿道。②终末血尿, 提示病变在膀胱颈部、三角区或后尿道。③全程血尿, 提示病变在膀胱或其以上部位。

3. 【问题】尿失禁如何区分?

【解答】尿失禁包括4种类型。

(1) 真性尿失禁: 又称完全性尿失禁, 常见原因为外伤、手术、先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌受损。

(2) 压力性尿失禁: 当腹压突然增加如咳嗽、喷嚏、大笑、突然起立时, 尿液不随意地流出。多见于经产妇。

(3) 充溢性尿失禁: 又称假性尿失禁, 指膀胱功能完全失去代偿, 膀胱过度充盈, 压力增高, 而引起尿液不断溢出。见于各种原因所致慢性尿潴留。

(4) 急迫性尿失禁: 严重的尿频、尿急而膀胱不受意识控制而发生的尿液排空, 通常发生于膀胱的严重感染。